

**alprazolam**

**GERMED FARMACÊUTICA LTDA**

**Comprimido**

**0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg e 2 mg**

## I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

alprazolam

“Medicamento Genérico, Lei nº. 9.787, de 1999”

### APRESENTAÇÕES

Comprimido de 0,25 mg, 0,5 mg, 1,0 mg ou 2,0 mg. Embalagem contendo 20, 30 ou 500\* unidades.

\*Embalagem hospitalar

### USO ORAL

#### USO ADULTO ACIMA DE 18 ANOS

### COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 0,25 mg contém:

alprazolam ..... 0,25 mg

excipiente\* q.s.p. .... 1 com

\*lactose monoidratada, celulose microcristalina, laurilsulfato de sódio, benzoato de sódio, dióxido de silício, amido e estearato de magnésio.

Cada comprimido de 0,5 mg contém:

alprazolam ..... 0,5 mg

excipiente\* q.s.p. .... 1 com

\*lactose monoidratada, celulose microcristalina, laurilsulfato de sódio, benzoato de sódio, dióxido de silício, amido, estearato de magnésio, óxido de ferro amarelo e óxido de ferro vermelho.

Cada comprimido de 1,0 mg contém:

alprazolam ..... 1,0 mg

excipiente\* q.s.p. .... 1 com

\*lactose monoidratada, celulose microcristalina, laurilsulfato de sódio, benzoato de sódio, dióxido de silício, amido, estearato de magnésio, vermelho de eritrosina dissódica e azul brilhante.

Cada comprimido de 2,0 mg contém:

alprazolam ..... 2,0 mg

excipiente\* q.s.p. .... 1 com

\*lactose monoidratada, celulose microcristalina, laurilsulfato de sódio, benzoato de sódio, dióxido de silício, amido e estearato de magnésio.

## II - INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

### 1. INDICAÇÕES

O alprazolam é indicado no tratamento de transtornos de ansiedade.

O alprazolam não deve ser administrado como substituição ao tratamento apropriado de psicose.

Os sintomas de ansiedade podem variavelmente incluir: tensão, medo, apreensão, inquietude, dificuldades de concentração, irritabilidade, insônia e/ou hiperatividade neurovegetativa, resultando em manifestações somáticas variadas.

O alprazolam também é indicado no tratamento dos transtornos de ansiedade associados a outras condições, como a abstinência ao álcool.

O alprazolam também está indicado no tratamento do transtorno do pânico, com ou sem agorafobia, cuja principal característica é a crise de ansiedade não esperada, um ataque súbito de apreensão intensa, medo ou terror.

### 2. RESULTADOS DE EFICÁCIA

#### Estudos Clínicos

##### Transtornos de Ansiedade

O alprazolam foi comparado ao placebo em estudos duplo-cegos (doses de até 4 mg/dia) em pacientes com um diagnóstico de ansiedade ou ansiedade associada a sintomas de depressão. O alprazolam foi significativamente melhor do que o placebo para cada período de avaliação destes estudos de 4 semanas, conforme a observação de vários instrumentos psicométricos, como a Escala de Impressão Clínica Global - gravidade, Escala de Hamilton de Ansiedade, Escala de Impressão Clínica Global – melhora e Escala de autoavaliação dos sintomas.

##### Transtorno do Pânico

Três estudos de curto prazo (até 10 semanas), duplo-cegos, controlados por placebo, dão suporte ao uso de alprazolam no tratamento do transtorno de pânico, conforme diagnóstico estabelecido utilizando-se o critério do DSM-III-R para este transtorno.

A dose média de alprazolam foi de 5-6 mg/dia em dois destes estudos, e as doses foram fixadas em 2 e 6 mg/dia no terceiro estudo. Em todos os três estudos clínicos, o alprazolam demonstrou-se superior ao placebo na variável definida como “o número de pacientes com nenhum ataque de pânico” (37 a 83% dos pacientes alcançaram este critério), bem como na variável sobre o escore de melhora global. Em dois destes três estudos, o alprazolam foi superior ao placebo na mudança do número de ataques de pânico por semana em comparação à linha de base (que variou de 3,3 a 5,2) e também na escala de fobia. Um subgrupo de pacientes que melhorou com alprazolam durante o tratamento de curto prazo continuou em uma fase aberta de até 8 meses, sem perda aparente do benefício do medicamento.

### Referências bibliográficas

1. ELIE, R.; LAMONTAGNE, Y. Alprazolam and Diazepam in the Treatment of Generalized Anxiety. *Journal of Clinical Psychopharmacology*, v. 4, n. 3, 1984.
2. ANDERSCH et al. Efficacy and safety of alprazolam, imipramine and placebo in treating panic disorder. A Scandinavian multicenter study. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, v. 83, n. 365, p. 18-27, 1984.
3. SHEEHAN, D. V.; RAJ, A. B.; HARNETT-SHEEHAN, K.; SOTO, S.; KNAPP, E. The relative efficacy of high-dose buspirone and alprazolam in the treatment of panic disorder: a double-blind placebo-controlled study. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, v. 88, n.1, p. 1-11, 1993.
4. LYDIARD, R.; LESSER, I; BALLENGER, J; RUBIN, R.; LARAIA, M.; DUPONT, R. A Fixed-Dose Study of Alprazolam 2 mg, Alprazolam 6 mg, and Placebo in Panic Disorder. *Journal of Clinical Psychopharmacology*, v. 12, n. 2, 1992.

## 3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

### Farmacodinâmica

Agentes do sistema nervoso central da classe de 1,4-benzodiazepínicos, presumivelmente, exercem seus efeitos através da ligação com receptores estéreo-específicos em vários locais no sistema nervoso central. Seu mecanismo de ação exato é desconhecido. Clinicamente, todos os benzodiazepínicos causam um efeito depressor, relacionado com a dose, que varia de um comprometimento leve de desempenho de tarefas à sedação.

### Farmacocinética

#### Absorção

Após a administração oral, o alprazolam é prontamente absorvido. Os picos de concentração plasmática ocorrem em 1h a 2 h após a administração. As concentrações plasmáticas são proporcionais às doses administradas; dentro do intervalo posológico de 0,5 mg a 3,0 mg, foram observados picos de 8,0 a 37 ng/mL. Com a utilização de uma metodologia de ensaio específico, foi observado que a meia-vida de eliminação plasmática média do alprazolam é de aproximadamente 11,2 h (variando entre 6,3 h – 26,9 h) em adultos saudáveis.

Foram relatadas alterações na absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos benzodiazepínicos em uma variedade de doenças, incluindo alcoolismo, insuficiência hepática e insuficiência renal. Também foram demonstradas alterações em pacientes geriátricos. Em indivíduos idosos sadios, foi observado que a meia-vida média do alprazolam é de 16,3 h (variando de 9,0 h – 26,9 h; n=16), comparado a 11,0 h (variando de 6,6 h – 15,8 h; n=16) em indivíduos adultos sadios. Em pacientes com doença alcoólica do fígado, a meia-vida do alprazolam variou de 5,8 h – 65,3 h (média de 19,7 h; n=17); quando comparado a 6,3 h – 26,9 h em indivíduos sadios (média: 11,4 h; n=17). Em um grupo de indivíduos obesos a meia-vida do alprazolam variou entre 9,9 h e 40,4 h (média de 21,8 h; n=12); quando comparado a indivíduos sadios, cuja variação foi de 6,3 h – 15,8 h (média de 10,6 h, n=12).

Devido à sua semelhança com outros benzodiazepínicos, presume-se que o alprazolam atravesse a placenta e seja excretado pelo leite materno.

### Dados de segurança pré-clínica

#### Mutagênese

O alprazolam não foi mutagênico no teste *in vitro* de Ames. O alprazolam não produziu aberrações cromossômicas no ensaio *in vivo* de micronúcleo em ratos até a dose mais elevada testada de 100 mg/kg, que é uma dose 500 vezes a dose diária máxima de 10 mg/dia recomendada para humanos. O alprazolam também não foi mutagênico no ensaio de diluição alcalina/lesão de DNA ou ensaio de Ames.

#### Carcinogênese

Não foram observadas evidências de potencial carcinogênico nos estudos de bioensaio de 2 anos do alprazolam em ratos que receberam doses de até 30 mg/kg/dia (150 vezes a dose diária máxima recomendada para humanos de 10 mg/dia) e em camundongos que receberam doses de até 10 mg/kg/dia (50 vezes a dose diária máxima de 10 mg/kg/dia recomendada para seres humanos).

## **Fertilidade**

O alprazolam não produziu comprometimento da fertilidade em ratos até a dose mais elevada testada de 5 mg/kg/dia, que é 25 vezes a dose diária máxima de 10 mg/dia recomendada para humanos.

## **Efeitos Oculares**

Quando ratos foram tratados oralmente com alprazolam, 3, 10 e 30 mg/kg/dia (15 a 150 vezes a dose diária máxima de 10 mg/kg/dia recomendada para seres humanos) por dois anos, uma tendência para um aumento da dose relacionados no número de catarata (feminino) e vascularização corneana (machos) foi observada. Estas lesões não aparecem até depois de 11 meses de tratamento.

## **Efeito de medicamentos anestésicos e sedativos**

Pesquisas não-clínicas demonstraram que a administração de medicamentos anestésicos e de sedação que bloqueiam os receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) e/ou potencializam a atividade do ácido gama-aminobutírico (GABA) pode aumentar a morte celular neuronal no cérebro e resultar em déficits a longo prazo na cognição e no comportamento de animais juvenis quando administrados durante o período de pico do desenvolvimento cerebral. Com base em comparações entre espécies não-clínicas, acredita-se que a janela de vulnerabilidade do cérebro a esses efeitos correlaciona-se com exposições humanas no terceiro trimestre de gravidez até o primeiro ano de vida, mas pode se estender até aproximadamente 3 anos de idade. Embora exista informação limitada sobre este efeito com o alprazolam, uma vez que o mecanismo de ação inclui a potencialização da atividade do GABA, um efeito semelhante pode ocorrer. A relevância desses achados não clínicos para o uso em humanos é desconhecida.

## **4. CONTRAINDICAÇÕES**

O alprazolam é contraindicado a pacientes com hipersensibilidade conhecida a benzodiazepínicos, alprazolam, ou a qualquer componente da formulação desse produto, e em pacientes portadores de miastenia gravis ou glaucoma de ângulo estreito agudo.

**Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos de idade.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. A paciente deve informar imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.**

## **5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

O uso concomitante de benzodiazepínicos e opioides pode resultar em sedação profunda, depressão respiratória, coma e morte. Limitar as dosagens e durações ao mínimo necessário.

Recomenda-se atenção especial no tratamento de pacientes com insuficiência renal ou hepática.

Habituação e dependência emocional/física podem ocorrer com benzodiazepínicos, inclusive com alprazolam.

Assim como com todos os benzodiazepínicos, o risco de dependência aumenta com doses maiores e utilização em longo prazo, sendo ainda maior em pacientes com história de alcoolismo ou abuso de substâncias. O abuso de substâncias é um risco conhecido para o alprazolam e outros benzodiazepínicos, e os pacientes devem ser monitorados adequadamente quando receberem alprazolam. O alprazolam pode ser sensível à retirada. Há relatos de mortes relacionadas à superdosagem quando o alprazolam é utilizado com outros depressores do sistema nervoso central (SNC), incluindo opioides, outros benzodiazepínicos e álcool. Esses riscos devem ser considerados ao prescrever ou dispensar alprazolam. Para reduzir esses riscos, a menor quantidade apropriada deve ser usada e os pacientes devem ser aconselhados sobre o armazenamento e descarte adequados do medicamento não utilizado (vide “Posologia e Modo de Usar”, “Reações Adversas” e “Superdose”).

Sintomas de abstinência ocorreram após diminuição rápida ou descontinuação abrupta de benzodiazepínicos, inclusive de alprazolam. Esses sintomas podem variar de leve disforia e insônia a uma síndrome mais importante, que pode incluir câibras musculares, cólicas abdominais, vômitos, sudorese, tremores e convulsões. Adicionalmente, crises epilépticas ocorreram com a diminuição rápida ou descontinuação abrupta do tratamento com alprazolam (vide “Posologia e Modo de Usar – Descontinuação do Tratamento” e “Reações Adversas”).

Transtornos do pânico têm sido associados a transtornos depressivos maiores primários e secundários e a relatos crescentes de suicídio entre pacientes não tratados. Dessa forma, deve-se ter cautela quando doses mais altas de alprazolam forem utilizadas no tratamento de pacientes com transtornos do pânico, a exemplo do que ocorre no tratamento de pacientes deprimidos com fármacos psicotrópicos ou naqueles em que há razões para se presumir planos ou pensamentos suicidas omitidos.

A administração a pacientes suicidas ou gravemente deprimidos deve ser realizada com as devidas precauções e com a prescrição de doses apropriadas.

Episódios de hipomania e mania têm sido relatados em associação com o uso de alprazolam em pacientes com depressão.

A utilização de alprazolam não foi estabelecida em certos tipos de depressão (vide “Indicações”).

## **Uso durante a Gravidez**

Os dados relacionados à teratogenicidade e aos efeitos sobre o desenvolvimento e o comportamento pós-natais após tratamento com benzodiazepínicos são inconsistentes. Existem evidências de alguns estudos iniciais com outros membros da classe dos benzodiazepínicos em que a exposição *in utero* pode estar associada a malformações. Estudos posteriores com fármacos da classe dos benzodiazepínicos não forneceram evidência clara de qualquer tipo de defeito.

Há descrições de crianças expostas aos benzodiazepínicos durante o fim do terceiro trimestre de gestação ou durante o parto que apresentaram tanto a síndrome da criança hipotônica (floppy infant syndrome) quanto sintomas neonatais de abstinência. Se alprazolam for utilizado durante a gravidez, ou se a paciente engravidar enquanto estiver utilizando alprazolam, ela deve ser informada do dano potencial ao feto.

Dados de estudos observacionais sugerem que existe um risco aumentado de aborto espontâneo devido à exposição a benzodiazepínicos durante a gravidez. Ao tratar mulheres em idade fértil, os benefícios do tratamento devem ser ponderados em relação aos riscos, e as pacientes devem ser informadas sobre o risco aumentado de aborto espontâneo.

**O alprazolam é um medicamento classificado na categoria D de risco de gravidez. Portanto, este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.**

#### **Uso durante a Lactação**

As concentrações de benzodiazepínicos, inclusive de alprazolam, são baixas no leite materno. No entanto, não se deve amamentar durante a utilização de alprazolam.

**Este medicamento é contraindicado durante o aleitamento ou doação de leite, pois é excretado no leite humano e pode causar reações indesejáveis no bebê. Seu médico ou cirurgião-dentista deve apresentar alternativas para o seu tratamento ou para a alimentação do bebê.**

#### **Efeitos na Habilidade de Dirigir e Operar Máquinas**

Os pacientes devem ser advertidos sobre o uso de alprazolam durante a condução de veículos ou iniciar outras atividades perigosas até que seja provado que eles não se tornem debilitados ao receber o medicamento.

**Orientar seu paciente a não dirigir veículos ou operar máquinas durante todo o tratamento com alprazolam, pois sua habilidade e capacidade de reação podem estar prejudicadas.**

**O uso deste medicamento pode causar tontura, desmaios ou perda da consciência, expondo o paciente a quedas ou acidentes.**

**Atenção: Contém Lactose (tipo de açúcar) abaixo de 0,25g por comprimido. Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.**

**Este produto contém benzoato de sódio, que pode causar reações alérgicas, como a asma, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.**

#### **Comprimido de 0,5 mg:**

**Atenção: Contém os corantes óxido de ferro amarelo e óxido de ferro vermelho.**

#### **Comprimido de 1,0 mg:**

**Atenção: Contém os corantes vermelho de eritrosina dissódica e azul brilhante.**

### **6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Os benzodiazepínicos, incluindo o alprazolam, produzem efeitos depressores aditivos no SNC, incluindo depressão respiratória, quando coadministrados com opioides, álcool ou outros fármacos que produzem depressão do sistema nervoso central (vide “Advertências e Precauções”).

Podem ocorrer interações farmacocinéticas quando alprazolam é administrado com fármacos que interferem no seu metabolismo. Compostos que inibem determinadas enzimas hepáticas (particularmente o citocromo P450 3A4) podem aumentar a concentração de alprazolam e acentuar sua atividade.

Os dados obtidos a partir de estudos clínicos com alprazolam, estudos *in vitro* com alprazolam e estudos clínicos com fármacos metabolizados similarmente ao alprazolam mostram interações de variados graus e possibilidade de interação com alprazolam para uma quantidade de fármacos. Baseando-se no grau de interação e no tipo de dados disponíveis, recomenda-se o seguinte:

- a coadministração de alprazolam com cetoconazol, itraconazol e outros antifúngicos azólicos não é recomendada;
- recomenda-se cautela e consideração da redução de dose quando alprazolam é coadministrado com nefazodona, fluvoxamina e cimetidina;
- também se recomenda cautela quando alprazolam é coadministrado com fluoxetina, propoxifeno, anticoncepcionais orais, diltiazem, ou antibióticos macrolídeos como eritromicina e troleandomicina;
- as interações envolvendo inibidores da protease do vírus da imunodeficiência humana (HIV) (por exemplo, ritonavir) e alprazolam são complexas e dependentes do tempo. Baixas doses de ritonavir resultaram em grande alteração do clearance de alprazolam, prolongaram sua meia-vida de eliminação e aumentaram seus efeitos clínicos. No entanto, sob

exposição prolongada ao ritonavir, a CYP3A compensou essa inibição. Essa interação torna necessário um ajuste de dose ou descontinuação de alprazolam;

- aumento nas concentrações de digoxina tem sido reportado quando alprazolam é administrado, especialmente em idosos (> 65 anos de idade). Pacientes que recebem alprazolam e digoxina devem, portanto ser monitorados em relação aos sinais e sintomas relacionados à toxicidade da digoxina.

## 7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade.

O prazo de validade do medicamento a partir da data de fabricação é de 24 meses.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Características físicas e organolépticas:

Comprimido de 0,25 mg na cor branca, circular e monossectado.

Comprimido de 0,5 mg na cor alaranjado, circular e monossectado.

Comprimido de 1,0 mg na cor roxo claro, circular e monossectado.

Comprimido de 2,0 mg na cor branca, circular e biconvexo.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## 8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

A dose ótima de alprazolam deve ser individualizada com base na gravidade dos sintomas e na resposta individual do paciente. Nos pacientes que requeiram doses mais elevadas, essas deverão ser aumentadas com cautela, a fim de evitar reações adversas. Em geral, os pacientes que não tenham sido previamente tratados com medicamentos psicotrópicos necessitarão de doses menores que aqueles previamente tratados com ansiolíticos menores, antidepressivos ou hipnóticos. Recomenda-se que o princípio geral de usar a menor dose eficaz seja seguido, especialmente em pacientes idosos ou debilitados, para evitar o desenvolvimento de sedação excessiva ou ataxia.

### Duração do tratamento

Os dados disponíveis corroboram a utilização da medicação por até 6 meses para transtornos de ansiedade e por até 8 meses no tratamento dos transtornos de pânico. O risco de dependência pode aumentar com a dose e a duração do tratamento, portanto, devem ser utilizadas a menor dose eficaz e a menor duração possível e, a necessidade de continuação do tratamento deve ser reavaliada frequentemente (vide “Advertências e Precauções”).

### Descontinuação do tratamento

Para descontinuar o tratamento com alprazolam, a dose deve ser reduzida lentamente, conforme prática médica adequada. É sugerido que a dose diária de alprazolam seja reduzida em não mais que 0,5 mg a cada 3 dias. Alguns pacientes podem necessitar de redução de dose ainda mais lenta (vide “Advertências e Precauções”).

### Uso em Crianças

A segurança e a eficácia de alprazolam em indivíduos com menos de 18 anos de idade não foram estabelecidas.

### Dosagem Recomendada

| Indicação                                                      | Dose inicial habitual (se ocorrerem efeitos colaterais, a dosagem deve ser diminuída) | Intervalo da dose habitual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transtornos de ansiedade                                       | 0,25 mg a 0,5 mg, administrados 3 vezes ao dia.                                       | 0,5 mg a 4,0 mg ao dia, administrados em doses divididas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Transtorno do pânico                                           | 0,5 mg a 1,0 mg antes de dormir ou 0,5 mg, administrados 3 vezes ao dia.              | A dose deve ser ajustada à resposta do paciente. Os ajustes de dose devem ser aumentados no máximo 1 mg a cada 3 ou 4 dias. Com alprazolam, doses adicionais podem ser acrescentadas até que seja alcançada uma posologia de 3 ou 4 vezes diariamente. A dose média em um grande estudo multicêntrico foi $5,7 \pm 2,27$ mg, com pacientes necessitando, ocasionalmente, de um máximo de 10 mg diariamente. |
| Pacientes geriátricos ou na presença de condições debilitantes | 0,25 mg administrados 2 ou 3 vezes ao dia.                                            | 0,5 mg a 0,75 mg ao dia, administrados em doses divididas; podem ser gradualmente aumentadas se necessário e tolerado.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Dose Omitida

Caso o paciente se esqueça de utilizar alprazolam no horário estabelecido, deve fazê-lo assim que lembrar. Entretanto, se já estiver perto do horário de administrar a próxima dose, deve desconsiderar a dose esquecida e utilizar a próxima. Neste caso, o paciente não deve utilizar a dose duplicada para compensar doses esquecidas. O esquecimento de dose pode comprometer a eficácia do tratamento.

## 9. REAÇÕES ADVERSAS

Os eventos adversos de alprazolam, se presentes, geralmente são observados no início do tratamento e habitualmente desaparecem com a continuidade do tratamento ou diminuição da dose.

Os eventos adversos associados ao tratamento com alprazolam em pacientes participantes de estudos clínicos controlados e em experiências pós-comercialização são os seguintes:

**Tabela de Reações Adversas**

| <b>Classe de Sistema de Órgãos</b>                               | <b>Muito Comum<br/>≥ 1/10</b>                                                          | <b>Comum<br/>≥ 1/100 e &lt; 1/10</b>                                                                        | <b>Incomum<br/>≥ 1/1 000 e &lt; 1/100</b>                                                             | <b>Raro<br/>≥ 1/10000 e &lt; 1/1000</b> | <b>Muito Raro<br/>&lt; 1/10000</b> | <b>Frequência desconhecida<br/>(não pode ser estimada pelos dados disponíveis)</b>                                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distúrbios endócrinos                                            |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                       |                                         |                                    | Hiperprolactinemia *                                                                                                 |
| Distúrbios da nutrição e do metabolismo                          |                                                                                        | Diminuição do apetite                                                                                       |                                                                                                       |                                         |                                    |                                                                                                                      |
| Distúrbios psiquiátricos                                         | Depressão                                                                              | Estado de confusão, desorientação, diminuição da libido, ansiedade, insônia, nervosismo, aumento da libido* | Mania* (vide “Advertências e Precauções”), alucinações*, raiva*, agitação*, dependência a substâncias |                                         |                                    | Hipomania*, agressividade*, hostilidade*, pensamento anormal*, e hiperatividade psicomotora*, abuso de substâncias * |
| Distúrbios do sistema nervoso                                    | Sedação, sonolência, ataxia, comprometimento da memória, disartria, tontura e cefaleia | Perturbação do equilíbrio, coordenação anormal, distúrbios de atenção, hipersonia, letargia e tremor        | Amnésia                                                                                               |                                         |                                    | Desequilíbrio autonômico do sistema nervoso * e distonia*                                                            |
| Distúrbios oculares                                              |                                                                                        | Visão turva                                                                                                 |                                                                                                       |                                         |                                    |                                                                                                                      |
| Distúrbios gastrointestinais                                     | Constipação e boca seca                                                                | Náusea                                                                                                      |                                                                                                       |                                         |                                    | Distúrbios gastrointestinais *                                                                                       |
| Distúrbios hepatobiliares                                        |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                       |                                         |                                    | Hepatite*, função hepática anormal * e icterícia *                                                                   |
| Distúrbios da pele e tecido subcutâneo                           |                                                                                        | Dermatite*                                                                                                  |                                                                                                       |                                         |                                    | Angioedema* e reação de fotossensibilidade*                                                                          |
| Distúrbios musculoesqueléticos, do tecido conjuntivo e dos ossos |                                                                                        |                                                                                                             | Fraqueza muscular                                                                                     |                                         |                                    |                                                                                                                      |
| Distúrbios urinários e renais                                    |                                                                                        |                                                                                                             | Incontinência urinária*                                                                               |                                         |                                    | Retenção urinária *                                                                                                  |

|                                             |                         |                                      |                                         |  |  |                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| Distúrbios do sistema reprodutivo e da mama |                         | Disfunção sexual *                   | Irregularidade s menstruais *           |  |  |                                 |
| Distúrbios gerais                           | Fadiga e irritabilidade |                                      | Síndrome de abstinência a substâncias * |  |  | Edema periférico*               |
| Investigações                               |                         | Diminuição do peso e aumento do peso |                                         |  |  | Aumento da pressão intraocular* |

\*Reações Adversas identificadas pós-comercialização

Em muitos dos relatos de casos espontâneos de efeitos comportamentais adversos, os pacientes estavam recebendo outros fármacos de ação no sistema nervoso central concomitantemente e/ou tinham doenças psiquiátricas subjacentes. Pacientes que apresentam um distúrbio de personalidade limítrofe, história prévia de comportamento violento ou agressivo ou abuso de bebidas alcoólicas ou outras substâncias, podem ser pacientes de risco para esses eventos. Foram relatados casos de irritabilidade, hostilidade e pensamentos intrusivos durante a interrupção da administração de alprazolam em pacientes com distúrbio de estresse pós-traumático.

**Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa.**

## 10. SUPERDOSE

As manifestações de superdose do alprazolam são extensões da sua ação farmacológica e incluem sonolência, fala arrastada, comprometimento da coordenação motora, coma e depressão respiratória. Sequelas sérias são raras, exceto quando há ingestão concomitante de outros fármacos e/ou etanol.

O tratamento de superdose é principalmente de suporte para a função respiratória e cardiovascular. Como em todos os casos de superdose, a respiração, o pulso e a pressão arterial devem ser monitorados. O valor da diálise não foi determinado. Como em todos os casos de superdose intencional de qualquer fármaco, deve-se ter em mente que múltiplos agentes podem ter sido ingeridos.

O flumazenil pode ser usado como um adjuvante para a administração das funções respiratórias e cardiovasculares associadas a superdose.

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## III – DIZERES LEGAIS

Registro: 1.0583.0854

Registrado por: **GERMED FARMACÊUTICA LTDA**

Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença, KM 08

Bairro Chácara Assay

Hortolândia/SP – CEP: 13186-901

CNPJ: 45.992.062/0001-65

Indústria Brasileira

Produzido por: **EMS S/A**

Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença, KM 08

Bairro Chácara Assay

Hortolândia/SP CEP: 13186-901

Ou

Produzido por: **NOVAMED FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA**

Av. Torquato Tapajós, 17.703 - Área de Transição

Manaus/AM CEP: 69.041-025

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO.**

**O ABUSO DESTES MEDICAMENTO PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA.**

**Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 29/05/2026.**

**bula-prof-402866-GER-v2**



### Histórico de Alteração da Bula

| Dados da submissão eletrônica |                |                                                                            | Dados da petição/notificação que altera bula |                                                     |                                                                                                           |                   | Dados das alterações de bulas                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                      |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Data do expediente            | Nº. expediente | Assunto                                                                    | Data do expediente                           | Nº. expediente                                      | Assunto                                                                                                   | Data de aprovação | Itens de bula                                                                                                                                                                                                                                                                         | Versões (VP/VPS) | Apresentações relacionadas                                           |
| 01/02/2017                    | 0172980/17-2   | (10459) – GENÉRICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula                     | N/A                                          | N/A                                                 | N/A                                                                                                       | N/A               | Submissão eletrônica apenas para disponibilização do texto de bula no Bulário eletrônico da ANVISA.                                                                                                                                                                                   | VP/VPS           | Embalagens contendo 20, 30 e 500 (embalagem hospitalar) comprimidos. |
| 21/08/2018                    | 0824671/18-8   | (10452) – GENÉRICO – Notificação de alteração de texto de Bula – RDC 60/12 | 26/01/2018                                   | 0137034/17-1<br>Para concentração 2mg               | 11022 - RDC 73/2016 - GENÉRICO - Inclusão de local de fabricação de medicamento de liberação convencional | 23/07/2018        | VP<br>II - Informações Ao Paciente:<br>O que devo saber antes de usarestes medicamento?<br>Como devo usar este medicamento?<br>III. DIZERES LEGAIS<br>VPS<br>3. Características farmacológicas<br>5. Advertências e precauções<br>6. Interações medicamentosas<br>III. DIZERES LEGAIS | VP/VPS           | Embalagens contendo 20, 30 e 500 (embalagem hospitalar) comprimidos. |
|                               |                |                                                                            |                                              | 0137025/17-1<br>Para concentrações 0,25mg/0,5mg/1mg |                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                      |
| 21/11/2018                    | 1100684/18-6   | 10452) – GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12  | --                                           | --                                                  | --                                                                                                        | --                | VP<br>4.O que devo saber antes de usarestes medicamento?<br>6. Como devo usar este medicamento?<br>7. O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento?<br>8. Quais os males que este medicamento pode me causar?<br>VPS<br>3.Características farmacológicas           | VP/VPS           | Embalagens contendo 20, 30 e 500 (embalagem hospitalar) comprimidos. |
| 08/03/2019                    | 0207019/19-7   | 10452) – GENÉRICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12  | N/A                                          | N/A                                                 | N/A                                                                                                       | N/A               | VP<br>4. O que devo saber antes de usarestes medicamento?<br>7. O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento?<br>8. Quais os males que este                                                                                                                        |                  | Embalagens contendo 20, 30 e 500 (embalagem hospitalar) comprimidos  |

|            |              |                                                                                            |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                         |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |                                                                                            |     |     |     |     | medicamento pode me causar?<br>VPS<br>3. Características farmacológicas<br>5. Advertências e precauções<br>6. Interações medicamentosas<br>9. Reações adversas                                                                     |        |                                                                                                                                         |
| 24/06/2019 | 0552562/19-4 | 10452 –<br>GENÉRICO<br>– Notificação<br>de Alteração<br>de Texto de<br>Bula – RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | VP<br>8. Quais os males que este<br>medicamento pode me<br>causar?<br>VPS<br>8. Posologia e modo de usar                                                                                                                           | VP/VPS | Embalagens<br>contendo 20, 30 e<br>500 (embalagem<br>hospitalar)<br>comprimidos                                                         |
| 30/07/2019 | 1906471/19-3 | 10452 –<br>GENÉRICO<br>– Notificação<br>de Alteração<br>de Texto de<br>Bula – RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | VP<br>8. Quais os males que este<br>medicamento pode me<br>causar?<br>VPS<br>3. Características farmacológicas                                                                                                                     | VP/VPS | Embalagens<br>contendo 20, 30 e<br>500 (embalagem<br>hospitalar)<br>comprimidos --                                                      |
| 09/04/2021 | 1363415/21-1 | 10452 –<br>GENÉRICO<br>– Notificação<br>de Alteração<br>de Texto de<br>Bula – RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | VPS<br>9 Reações Adversas                                                                                                                                                                                                          | VPS    | Embalagens<br>contendo 20, 30 e<br>500 (embalagem<br>hospitalar)<br>comprimidos --                                                      |
| 12/07/2022 | 4415791/22-1 | 10452 –<br>GENÉRICO<br>– Notificação<br>de Alteração<br>de Texto de<br>Bula – RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | DIZERES LEGAIS                                                                                                                                                                                                                     | VP/VPS | Comprimido de<br>0,25 mg, 0,5 mg,<br>1,0 mg ou 2,0 mg.<br>Embalagem<br>contendo 20, 30<br>ou 500* unidades.<br>*Embalagem<br>hospitalar |
| 09/09/2024 | -            | 10452 –<br>GENÉRICO<br>– Notificação<br>de Alteração<br>de Texto de<br>Bula – RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | Padronizações internas<br>3. Quando não devo usar este<br>medicamento?<br>4. O que devo saber antes de<br>usar este medicamento?<br>5. Onde, como e por quanto<br>tempo posso guardar este<br>medicamento?<br>III – DIZERES LEGAIS | VP     | Comprimido de<br>0,25<br>mg, 0,5 mg, 1,0<br>mg ou<br>2,0 mg.<br>Embalagem<br>contendo 20, 30<br>ou 500*<br>unidades.                    |

|  |  |                                                                                             |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                             |     |     |     |     | Padronizações internas<br>4. Contraindicações<br>5. Advertências e precauções<br>7. Cuidados de armazenamento do medicamento<br>III – DIZERES LEGAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VPS    | *Embalagem hospitalar                                                                                            |
|  |  | (10452) –<br>GENÉRICO –<br>Notificação<br>de Alteração<br>de Texto de<br>Bula –RDC<br>60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | VP<br><br>3. QUANDO NÃO DEVO<br>USAR ESTE<br>MEDICAMENTO?<br>4. O QE DEVO SABER<br>ANTES DE USAR ESTE<br>MEDICAMENTO?<br>5. ONDE, COMO E POR<br>QUANTO TEMPO<br>POSSO GUARDAR<br>ESTE MEDICAMENTO?<br>9. QUE FAZER<br>SEALGUÉM USAR<br>UMA QUANTIDADE<br>MAIOR DO QUE A<br>INDICADA DESTE<br>MEDICAMENTO?<br><br>VPS<br><br>4. CONTRAINDICAÇÃO<br>5. ADVERTÊNCIAS E<br>PRECAUÇÕES<br>7. CUIDADOS DE<br>ARMAZENAMENTO DO<br>MEDICAMENTO<br>DIZERES LEGAIS | VP/VPS | Comprimido<br>de 0,25 mg, 0,5<br>mg, 1,0 mg ou<br>2,0 mg.<br>Embalagem<br>contendo 20,<br>30 ou 500*<br>unidades |