

SPORANOX[®]

(itraconazol)

Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda.

cápsulas duras

100 mg

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Sporanox®

Cápsulas Duras

itraconazol

APRESENTAÇÕES

Cápsulas duras de 100 mg de itraconazol em embalagens contendo 28 cápsulas.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula contém 100 mg de itraconazol.

Excipientes: hipromelose, núcleos individualizados (esferas de açúcar compostas de amido, água purificada e sacarose) e macrogol.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1. INDICAÇÕES

Sporanox® é indicado para as seguintes patologias:

- Indicações ginecológicas:
 - Tratamento de candidíase vulvovaginal.
- Indicações dermatológicas/mucosas/ofthalmológicas:
 - Tratamento de dermatomicoses, incluindo regiões altamente queratinizadas, como na tinea da palma das mãos e da planta dos pés;
 - Tratamento de pitiríase versicolor;
 - Tratamento de candidíase oral;
 - Tratamento de ceratite fúngica.
- Tratamento de onicomicoses causadas por dermatófitos e/ou leveduras.
- Micoses sistêmicas, somente nas seguintes infecções fúngicas:
 - Tratamento de aspergilose e candidíase sistêmicas;
 - Profilaxia de infecções fúngicas em pacientes imunocomprometidos com neutropenia grave;
 - criptococose (incluindo meningite criptocócica);
 - Tratamento de pacientes imunocomprometidos com criptococose e em todos os pacientes com criptococose do sistema nervoso central, somente quando o tratamento de primeira linha é considerado inadequado ou se mostrou ineficaz;

- Para terapia de manutenção de meningite criptocócica em pacientes com AIDS, somente quando o tratamento de primeira linha é considerado inapropriado ou se mostrou ineficaz.
 - Tratamento de histoplasmose;
 - Histoplasmose, terapia de manutenção apenas em pacientes com AIDS;
 - Talaromicose (anteriormente, Peniciliose), terapia de manutenção apenas em pacientes com AIDS;
 - Tratamento de blastomicose;
 - Tratamento de esporotricose, incluindo linfocutânea/cutânea e extracutânea;
 - Tratamento de paracoccidioidomicose;
 - Tratamento de cromoblastomicose (anteriormente conhecido como cromomicose).

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA

Dermatofitoses

Em um estudo multicêntrico envolvendo 2.741 pacientes com infecções por dermatófitos, no qual os pacientes foram tratados durante 15 ou 30 dias com 100 mg de itraconazol diariamente, a taxa de resposta foi de 93% para o tratamento de *Tinea corporis* / *Tinea cruris* durante 15 dias. A resposta ao tratamento em pacientes com *Tinea pedis* / *Tinea manus* foi de 85% e 86% em grupos tratados durante 15 e 30 dias, respectivamente. O tempo mediano para o início da melhora clínica foi de 7 a 8 dias.¹

Um estudo duplo-cego, controlado com placebo utilizando 50 mg de itraconazol demonstrou uma taxa de cura significativamente superior ao placebo. Comparando-se 50 mg e 100 mg administrados diariamente até obter-se a cura clínica em 173 pacientes com 185 locais de infecção (91 casos de *Tinea corporis* / *cruris*, 94 casos de *Tinea pedis* / *manus*) observou-se que ambos foram efetivos com resposta de 80% em todos os grupos tratados, sendo que os pacientes recebendo 100 mg diários manifestaram sinais de melhora mais rápida.²

Criptococose

Foi descrito o uso de 200 mg de itraconazol duas vezes/dia em 48 pacientes com infecções criptocócicas. Entre os 28 pacientes avaliáveis com meningite criptocócica, 24 tinham AIDS. Dezoito dos 28 pacientes obtiveram resposta completa (resolução clínica e culturas do líquido negativas); seis pacientes tiveram resposta parcial e em quatro a terapia falhou. Respostas parciais ou falhas estavam associadas a falhas de tratamentos antifúngicos prévios, doença grave, baixas concentrações séricas de itraconazol ou resistência do microrganismo.¹

Aspergilose

Aspergilose invasiva é mais frequentemente observada em pacientes imunocomprometidos e está associada à alta morbidade e mortalidade. Em três séries, um total de 54 pacientes com aspergilose invasiva foi tratado com 100 a 400 mg de itraconazol diariamente. Praticamente todos os pacientes estavam imunocomprometidos. No geral, 42 pacientes foram considerados curados após tratamento com itraconazol.¹

Em uma visão geral e experiências utilizando itraconazol para tratar micoses sistêmicas, 78% dos pacientes (n = 60) diagnosticados com aspergilose invasiva obtiveram melhora através do tratamento com itraconazol, 53% ficaram curados ou melhoraram significativamente e 25% obtiveram melhora moderada, com doses diárias de 200 mg por um período de duração de 4 meses.²

Blastomicose

Quarenta e oito pacientes com cultura ou histopatologia com evidência de blastomicose foram tratados com doses diárias de 200 a 400 mg de itraconazol. O tratamento foi considerado sucesso em 43 pacientes (89,5%) e teve duração mediana de 6,2 meses.¹

Paracoccidioidomicose

Em 51 pacientes tratados com 50 ou 100 mg de itraconazol diariamente durante 6 a 12 meses, foi observada cura clínica ou melhora significativa dos sintomas em 100% dos pacientes.¹

Pitíriase versicolor

Um estudo envolveu 60 pacientes com pitíriase versicolor, escolhidos randomicamente e divididos em 3 grupos de 20 pacientes cada. Fez-se uma avaliação clínica e micológica antes do tratamento e no 7º e 28º dias após o tratamento. Doses de 400 mg/dia durante 3 dias e 200 mg/dia durante 5 dias foram consideradas eficazes para tratamento de pitíriase versicolor.³

Em um estudo multicêntrico aberto, não comparativo, foram analisados 333 pacientes que receberam duas cápsulas de 100 mg de itraconazol, via oral, uma vez ao dia durante cinco dias. Os pacientes foram submetidos a avaliações clínica e micológica pré-tratamento e 30 dias após o término do tratamento. Observou-se cura micológica em 93,7% dos casos.⁴

Candidíase vaginal

Estudo multicêntrico, simples-cego, randomizado, de grupos paralelos foi realizado utilizando 200 mg de itraconazol duas vezes ao dia em 109 pacientes com candidíase vaginal. A cura micológica após uma semana de tratamento foi alcançada em 74% das pacientes tratadas com itraconazol. Um número significativamente maior de pacientes preferiu o tratamento com itraconazol ao tratamento prévio recebido.⁵

Pacientes com candidíase vulvovaginal aguda micologicamente confirmada (n = 229) foram randomicamente distribuídas para receber: 200 mg de itraconazol duas vezes ao dia por 1 dia, comparativo oral ou comparativo tópico. Obteve-se cura micológica em 96% das pacientes do grupo itraconazol, comprovando sua eficácia no tratamento da candidíase vaginal aguda.⁶

Foram estudadas 101 pacientes portadoras de candidíase vaginal, confirmadas clínica e micologicamente em um estudo multicêntrico aberto, comparativo, randomizado. A dose de itraconazol foi 200 mg, duas vezes ao dia, por um dia. No 28º dia, os resultados mostraram que 70% das mulheres do grupo itraconazol estavam clinicamente e micologicamente curadas enquanto que no grupo comparativo esta resposta foi de 40%. Considerando-se somente a cura micológica, o percentual foi de 84%.⁷

Candidíase oral e esofágica

Estudou-se a atividade do itraconazol e de outro agente com atividade antifúngica em 111 pacientes HIV positivos com candidíase oral e esofágica. Os pacientes foram randomicamente distribuídos para receber 200 mg/dia de itraconazol ou 200 mg de cetoconazol duas vezes/dia durante 28 dias, em estudo duplo-cego. Após uma semana de tratamento, 75% e 82% dos pacientes recebendo itraconazol e cetoconazol, respectivamente, responderam clinicamente e após 4 semanas de tratamento esta taxa aumentou para 93% em ambos os grupos.⁸

Onicomicoses

Realizou-se um estudo envolvendo 182 pacientes tratados oralmente com itraconazol cápsulas duas vezes ao dia. A taxa de cura foi 90,9% em 55 dos pacientes com onicomicose nas unhas das mãos e 80,3% em 127 pacientes com onicomicose nas unhas dos pés e ambas ao mesmo tempo. A melhora do aspecto das infecções fúngicas foi de 98% e 96,5% para os pacientes com onicomicoses nos dedos das mãos e dos pés, respectivamente.⁹

Histoplasmose

Realizou-se um estudo com 37 pacientes HIV negativos com histoplasmose pulmonar crônica (27 pacientes) ou histoplasmose extrapulmonar localizada ou disseminada (10 pacientes). A principal doença de base era a doença pulmonar obstrutiva crônica tratada com doses altas de **Sporanox**® (200-400 mg diários) durante uma média de 9 meses. O sucesso da terapia foi observado em 81% dos pacientes. Todos os pacientes com a forma disseminada crônica, com envolvimento mediastinal ou nódulo parenquimatoso pulmonar, ou ambos, foram curados.¹⁰

A eficácia de **Sporanox**[®] foi avaliada em 27 pacientes adicionais portadores de AIDS com histoplasmose disseminada confirmada. Onze pacientes apresentavam reações sorológicas positivas. Os pacientes foram tratados com 200 mg diários (24 pacientes) ou 400 mg diários (3 pacientes) durante 6 meses e aqueles considerados curados após terapia de indução, foram mantidos com 100 mg/dia de **Sporanox**[®] como terapia de supressão. Em geral, 85% dos pacientes responderam à terapia.¹¹

Esporotricose

Um total de 78 pacientes com esporotricose foi tratado com 100 mg/dia de itraconazol, durante uma média de 94 dias. A resposta clínica global nos pacientes avaliáveis foi de 100% para o tipo cutâneo (n = 32) e 90% para o tipo linfático (n = 39). Um de dois pacientes com esporotricose disseminada respondeu ao tratamento. Ao final do tratamento as culturas foram negativas em 93% dos pacientes com esporotricose cutânea e em 82% dos pacientes com esporotricose linfática.¹²

Referências bibliográficas

1. Zuckerman JM, Tunkel AR.. Itraconazole: A New Triazole Antifungal Agent. Infect Control Hosp. Epidemiol 1994, 15: 397 - 410.
2. Grant SM., Clissold SP. Itraconazole: A Review of its Pharmacodynamic and Pharmacokinetic Properties, and Therapeutic Use in Superficial and Systemic Mycoses. Drugs 3^a, 1989, 310 - 344.
3. Kocuturk A et al. Efficacy of Three Short-term Regimens of Itraconazole in the Treatment of Pityriasis Versicolor. Journal of Dermatological Treatment 2002, 13: 185 - 187.
4. Zaitz C., Sampaio S. Avaliação da Eficácia e Tolerabilidade do Itraconazol no Tratamento da Pitiríase Versicolor. An bras Dermatol. Rio de Janeiro 1995, 70 (3): 195 - 198.
5. Tobin JM, et al. Treatment of Vaginal Candidosis: A Comparative Study of the Efficacy and Acceptability of Itraconazole and Clotrimazole. Genitourin Med 1992, 68 (1): 36 - 38.
6. Woolley PD, Higgins SP. Comparison of Clotrimazole, Fluconazole and Itraconazole in Vaginal Candidiasis. Br J. Clin Pract. 1995, 49 (2): 65 - 66.
7. Kogos W, et al. Estudo Multicêntrico Comparativo da Eficácia, Tolerabilidade e Índice de Recidiva do itraconazol e do fluconazol, Por Via Oral, no Tratamento da Candidíase Vaginal. Ginecologia e Obstetrícia 1993, 4 (2): 89 - 97.
8. Smith DE. et al. Itraconazole versus Ketoconazole in the Treatment of Oral and Oesophageal Candidosis in Patients Infected with HIV. AIDS 1991, 5:1367 - 1371.
9. XU Li-bin et al. Treatment of Onychomycosis by Pulse Usage of Itraconazole. J Clin. Dermatol. 2002, Vol. 31, No 2.
10. Dismukes WE, Bradsher RW, Cloud GC, et al. Itraconazole Therapy for Blastomycosis and Histoplasmosis. Am J Med 1992, 93: 489 - 497.
11. Negroni R. et al. Itraconazole in the Treatment of Histoplasmosis with AIDS. Mycoses 1992, 35: 281 - 287.
12. Data on file. Janssen Research Foundation, Belgium, 1990.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

Propriedades Farmacodinâmicas

Mecanismo de ação

Estudos in vitro demonstraram que o itraconazol inibe a síntese do ergosterol em células fúngicas. O ergosterol é um componente vital da membrana celular dos fungos. A inibição da sua síntese tem como última consequência um efeito antifúngico.

Relação farmacocinética/farmacodinâmica

A relação farmacocinética/farmacodinâmica para itraconazol, e para os triazóis em geral, é pouco compreendida.

Efeitos farmacodinâmicos

Microbiologia

O itraconazol, um derivado triazólico, apresenta amplo espectro de ação.

Para o itraconazol, a interpretação de pontos de corte não foi estabelecida por CLSI para *Candida spp.* e fungos filamentosos.

Pontos de corte de EUCAST para itraconazol foram estabelecidos para *Aspergillus flavus*, *A. fumigatus*, *A. nidulans* e *A. terreus*, e são os seguintes: sensível ≤ 1 mg/L, resistente > 1 mg/L. Os pontos de corte do EUCAST para itraconazol foram estabelecidos para *Candida albicans* e *C. dubliniensis* e são os seguintes: sensível $\leq 0,06$ mg/L, resistente $> 0,06$ mg/L. Os pontos de corte do EUCAST para itraconazol foram estabelecidos para *Candida parapsilosis* e *C. tropicalis* e são os seguintes: sensível $\leq 0,125$ mg/L, resistente $> 0,125$ mg/L. Pontos de corte interpretativos não foram estabelecidos pelo EUCAST para *Candida glabrata*, *C. krusei*, *C. guilliermondii*, *Cryptococcus neoformans* e para pontos de corte não relacionados à espécies específicas de *Candida* e *Cryptococcus*.

Estudos in vitro demonstraram que o itraconazol inibe o crescimento de um amplo espectro de fungos patogênicos aos seres humanos em concentrações geralmente entre ≤ 1 mcg/mL, incluindo:

Aspergillus spp., *Blastomyces dermatitidis*, *Cladosporium spp.*, *Coccidioides immitis*, *Cryptococcus neoformans*, *Geotrichum spp.*, *Histoplasma spp.*, inclusive *H. capsulatum*, *Paracoccidioides brasiliensis*, *Talaromyces* (anteriormente, *Penicillium*) *marneffe*, *Sporothrix schenckii* e *Trichosporon spp.* O itraconazol também apresentou atividade in vitro contra *Epidermophyton floccosum*, *Fonsecaea spp.*, *Malassezia spp.*, *Microsporum spp.*, *Pseudallescheria boydii*, *Trichophyton spp.* e vários outros fungos e leveduras.

Os principais tipos de fungos não inibidos pelo itraconazol são Zygomycetes (por exemplo, *Rhizopus spp.*, *Rhizomucor spp.*, *Mucor spp.* e *Absidia spp.*), *Fusarium spp.*, *Scedosporium spp.* e *Scopulariopsis spp.*

A resistência aos azóis parece se desenvolver lentamente e, frequentemente, resulta de diversas mutações genéticas. Os mecanismos descritos são superexpressão de ERG11, que codifica a enzima alvo 14 α -demetilase, mutações pontuais no ERG11 que levam à diminuição da afinidade do alvo e/ou superexpressão do transportador resultando, em aumento do efluxo. Foi observada resistência cruzada entre membros da classe dos azóis com *Candida spp.*, embora a resistência para um membro da classe não necessariamente confira resistência para outros azóis. Foram relatadas cepas de *Aspergillus fumigatus* resistentes ao itraconazol.

Propriedades Farmacocinéticas

Características farmacocinéticas gerais

Os picos de concentração plasmática do itraconazol são atingidos de 2 a 5 horas após administração oral. Como consequência da farmacocinética não linear, o itraconazol se acumula no plasma durante a administração de doses múltiplas. As concentrações no estado de equilíbrio são geralmente alcançadas em 15 dias, com valores de C_{max} de 0,5 mcg/mL, 1,1 mcg/mL e 2,0 mcg/mL após administração oral de 100 mg uma vez ao dia, 200 mg uma vez ao dia e 200 mg duas vezes ao dia, respectivamente. Em geral, a meia-vida terminal do itraconazol varia de 16 a 28 horas após dose única e aumenta para 34 a 42 horas com administração repetida. Terminado o tratamento, a concentração plasmática de itraconazol diminui para uma concentração quase indetectável em 7 a 14 dias, dependendo da dose e da duração do tratamento. Após administração intravenosa, a depuração plasmática total média é de 278 mL/min. A depuração do itraconazol diminui em doses maiores devido à saturação do seu metabolismo hepático.

Absorção

O itraconazol é rapidamente absorvido após administração oral. Picos de concentração plasmática do fármaco inalterado são obtidos 2 a 5 horas após administração de uma dose oral da cápsula. A biodisponibilidade oral absoluta de itraconazol é cerca de 55% e é máxima quando as cápsulas são ingeridas imediatamente após uma refeição completa.

A absorção das cápsulas de itraconazol é menor em indivíduos com acidez gástrica reduzida, como naqueles tomando medicamentos supressores da secreção do ácido gástrico (por exemplo, antagonistas de receptor H_2 , inibidores da bomba de prótons) ou com acloridria causada por certas doenças (vide “Advertências e precauções” e “Interações medicamentosas”). Nestes indivíduos, a absorção de itraconazol em jejum aumenta quando **Sporanox**[®] cápsulas é administrado com uma bebida ácida (como refrigerantes não dietéticos à base de cola). Quando as cápsulas de **Sporanox**[®] são administradas em dose única de 200 mg em jejum com refrigerante não dietético à base de cola, após pré-tratamento com ranitidina (antagonista do receptor H_2), a absorção de itraconazol foi comparável à observada quando **Sporanox**[®] cápsulas foi administrado isoladamente (vide “Interações medicamentosas”).

A exposição ao itraconazol é menor com a formulação cápsula em comparação à solução oral, quando a mesma dose do medicamento é administrada (vide “Advertências e precauções”).

Distribuição

A maior parte do itraconazol disponível no plasma está ligada a proteínas (99,8%), sendo a albumina a principal proteína de ligação (99,6% para o hidróxi-metabólito). Também há afinidade considerável por lipídeos. Apenas 0,2% do itraconazol presente no plasma está na forma livre. O itraconazol se distribui em volume corpóreo aparentemente grande ($>700L$), sugerindo extensa distribuição nos tecidos. As concentrações encontradas nos pulmões, rim, fígado, ossos, estômago, baço e músculos foram 2 a 3 vezes maiores do que as concentrações correspondentes no plasma, e a captação pelos tecidos queratinizados, particularmente a pele, foi até 4 vezes maior. As concentrações no líquido cefalorraquidiano são muito menores do que no plasma, mas foi demonstrada eficácia contra infecções no líquido cefalorraquidiano.

Metabolismo

O itraconazol é extensamente metabolizado no fígado, transformando-se em grande número de metabólitos. Como demonstrado nos estudos in vitro, CYP3A4 é a principal enzima envolvida no metabolismo do itraconazol. O principal metabólito é o hidróxi-itraconazol, que apresenta, in vitro, atividade antifúngica comparável à do itraconazol. As concentrações plasmáticas mínimas deste metabólito são aproximadamente duas vezes as do itraconazol.

Excreção

O itraconazol é excretado principalmente como metabólitos inativos na urina (35%) e nas fezes (54%) dentro de uma semana após administração de uma dose de solução oral. A excreção renal do itraconazol e do metabólito ativo hidróxi-itraconazol representa menos de 1% de uma dose intravenosa. Com base em uma dose oral marcada radioativamente, a excreção fecal do medicamento inalterado varia de 3% a 18% da dose.

Como a redistribuição do itraconazol a partir dos tecidos queratinizados é aparentemente desprezível, a eliminação do itraconazol destes tecidos está relacionada à regeneração epidérmica. Ao contrário do plasma, a concentração na pele permanece por 2 a 4 semanas após término de um tratamento de 4 semanas de duração e na queratina das unhas, onde o itraconazol pode ser detectado já com uma semana de tratamento, por pelo menos, seis meses após final de um tratamento de 3 meses.

Populações especiais

- Insuficiência hepática

O itraconazol é predominantemente metabolizado pelo fígado. Estudo de farmacocinética foi conduzido em 6 indivíduos saudáveis e 12 pacientes com cirrose, que receberam uma dose única de 100 mg de itraconazol na forma de cápsula. Redução estatisticamente significativa na C_{max} média (47%) e aumento de duas vezes na meia-vida de eliminação (37 ± 17 horas versus 16 ± 5 horas) do itraconazol foram observados em pacientes com cirrose comparado aos indivíduos saudáveis. Entretanto, a exposição geral ao itraconazol baseada na AUC foi similar em pacientes com cirrose e indivíduos saudáveis. Dados sobre o uso prolongado de itraconazol em pacientes com cirrose não estão disponíveis (vide “Posologia e modo de usar” e Advertências e precauções”).

- Insuficiência renal

Dados limitados estão disponíveis sobre o uso oral de itraconazol em pacientes com insuficiência renal. Um estudo de farmacocinética usando uma dose única de 200 mg de itraconazol (quatro cápsulas de 50 mg) foi conduzido em três grupos de pacientes com insuficiência renal (uremia: n=7; hemodiálise: n=7 e diálise peritoneal ambulatorial contínua: n=5). Em indivíduos urêmicos, com depuração média de creatinina de 13 mL/min x 1,73 m², a exposição baseada na AUC foi ligeiramente reduzida em comparação aos parâmetros da população normal. Este estudo não demonstrou nenhum efeito significativo da hemodiálise ou da diálise peritoneal ambulatorial contínua na farmacocinética do itraconazol (T_{máx}, C_{máx} e AUC_{0-8h}). Os perfis de concentração plasmática versus tempo mostraram ampla variação entre os indivíduos nos três grupos.

Após dose intravenosa única, as meias-vidas terminais médias do itraconazol em pacientes com insuficiência renal leve (definida neste estudo como depuração de creatinina = 50-79 mL/min), moderada (definida neste estudo como depuração de creatinina = 20-49 mL/min) e grave (definida neste estudo como depuração de creatinina < 20 mL/min) foram semelhantes às de indivíduos saudáveis (variação média de 42-49 horas versus 48 horas em pacientes com comprometimento renal e indivíduos saudáveis, respectivamente). A exposição global ao itraconazol, baseada na AUC, diminuiu em aproximadamente 30% e 40% em pacientes com insuficiência renal moderada e grave, respectivamente, em comparação aos indivíduos com função renal normal.

Não há dados disponíveis em pacientes com comprometimento renal durante uso de itraconazol a longo prazo. A diálise não tem efeito na meia-vida ou na depuração do itraconazol ou hidróxi-itraconazol (vide "Posologia e modo de usar" e "Advertências e precauções").

4. CONTRAINDICAÇÕES

Sporanox[®] cápsulas é contraindicado em pacientes que apresentam hipersensibilidade ao itraconazol ou aos excipientes da formulação.

A coadministração de certos substratos da CYP3A4 é contraindicada com **Sporanox**[®] cápsulas. O aumento das concentrações plasmáticas destes medicamentos, causado pela coadministração com itraconazol, pode aumentar ou prolongar tanto os efeitos terapêuticos como os efeitos adversos de tal forma que uma situação potencialmente grave pode ocorrer. Por exemplo, o aumento das concentrações plasmáticas de alguns destes medicamentos pode levar ao prolongamento do intervalo QT e a taquiarritmias ventriculares, inclusive Torsade de Pointes, uma arritmia potencialmente fatal. A administração conjunta de itraconazol é contraindicada (durante e por 2 semanas após o uso) com medicamentos ou substâncias como: alcalóides do Ergot, astemizol, avanafil, bepridil, cisaprida, colchicina em pacientes com insuficiência renal ou hepática, dapoxetina, diidroergotamina, disopiramida, dofetilida, domperidona, dronedarona, eliglustat em metabolizadores extensos do CYP2D6 que tomam um inibidor forte ou moderado do CYP2D6 e em metabolizadores intermediários ou fracos do CYP2D6, eplerenona, ergometrina, ergotamina, felodipina, fesoterodina em pacientes com insuficiência renal ou hepática moderada a grave, finerenona, halofantrina, irinotecano, isavuconazol, ivabradina, lercanidipina, levacetilmetadol (levometadil), lomitapida, lovastatina, lurasidona, metadona, metilergometrina, midazolam (oral), mizolastina, mobocertinibe, naloxegol, nisoldipina, pimozida, quinidina, ranolazina, sertindol, sinvastatina, solifenacina em pacientes com insuficiência renal grave ou insuficiência hepática moderada a grave, telitromicina em pacientes com insuficiência renal ou hepática, terfenadina, ticagrelor, triazolam, venetoclax em pacientes com leucemia linfocítica crônica/linfoma linfocítico pequeno durante a fase de início/titulação/aumento da dose de venetoclax, voclosporina (vide "Interações medicamentosas").

Sporanox[®] cápsulas não deve ser administrado em pacientes com evidências de disfunção ventricular, como insuficiência cardíaca congestiva ou histórico de insuficiência cardíaca congestiva, exceto se o paciente correr risco de vida e em caso de outras infecções graves (vide "Advertências e precauções").

Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com insuficiência cardíaca.

Gravidez (Categoria C)

Sporanox[®] cápsulas não deve ser administrado durante a gravidez (exceto nos casos de risco de vida) (vide "Advertências e precauções – Gravidez, Lactação e Fertilidade").

Em estudos em animais, o itraconazol apresentou toxicidade reprodutiva (vide "Dados de segurança pré-clínicos").

Existem informações limitadas a respeito do uso de **Sporanox**[®] durante a gravidez. Durante a experiência pós-comercialização foram relatados casos de anormalidades congênitas, incluindo tanto malformações esqueléticas, do trato genitourinário, cardiovascular e oftalmológica, como malformações cromossômicas e múltiplas. A relação causal com **Sporanox**[®] não foi estabelecida.

Dados epidemiológicos da exposição a **Sporanox**[®] durante o primeiro trimestre da gravidez (maioria das pacientes recebendo tratamento de curto prazo para candidíase vulvovaginal) não demonstraram risco aumentado de malformação quando comparados aos indivíduos controles não expostos a teratógenos conhecidos. Tem sido demonstrado que itraconazol atravessa a placenta em ratos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas, sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Mulheres em idade fértil utilizando **Sporanox**[®] devem tomar precauções contraceptivas. Contracepção altamente efetiva deve ser continuada até o próximo período menstrual após término do tratamento com **Sporanox**[®].

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Efeitos cardíacos

Em um estudo com **Sporanox**[®] intravenoso realizado em voluntários saudáveis foi observado redução transitória assintomática na fração de ejeção do ventrículo esquerdo que se resolveu antes da infusão seguinte. A relevância clínica destes achados para as formulações orais é desconhecida.

O itraconazol mostrou efeito inotrópico negativo e **Sporanox**[®] tem sido associado a relatos de insuficiência cardíaca congestiva. Insuficiência cardíaca foi mais frequentemente relatada nos relatos espontâneos para a dose diária total de 400 mg do que para doses diárias totais menores, sugerindo que o risco de insuficiência cardíaca pode aumentar com a dose diária total de itraconazol.

Sporanox[®] não deve ser utilizado em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva ou com história de insuficiência cardíaca congestiva a menos que os benefícios superem claramente os riscos. A avaliação individual do risco/benefício deve considerar fatores como a gravidade da indicação, o esquema posológico (por exemplo: dose diária total) e fatores de risco individuais para insuficiência cardíaca congestiva. Estes fatores de risco incluem doença cardíaca, como isquemia e doença valvular; doença pulmonar significativa, como doença pulmonar obstrutiva crônica; e insuficiência renal e outros distúrbios edematosos. Tais pacientes devem ser informados dos sinais e sintomas da insuficiência cardíaca congestiva, devem ser tratados com cautela, e ser monitorados quanto aos sinais e sintomas de insuficiência cardíaca congestiva durante o tratamento; se sinais ou sintomas ocorrerem durante o tratamento, **Sporanox**[®] deve ser descontinuado.

Bloqueadores dos canais de cálcio podem ter efeito inotrópico negativo que pode ser aditivo ao do itraconazol. Adicionalmente, itraconazol pode inibir o metabolismo dos bloqueadores dos canais de cálcio. Portanto, deve-se ter cautela ao administrar concomitantemente itraconazol e bloqueadores dos canais de cálcio, devido a maior risco de insuficiência cardíaca congestiva.

Este medicamento pode potencializar o prolongamento do intervalo QT, o que aumenta o risco de ataque de arritmias ventriculares graves do tipo “torsades de pointes”, que é potencialmente fatal (morte súbita).

Potencial para interações

A coadministração de medicamentos específicos com itraconazol pode resultar em alterações da eficácia do itraconazol e/ou do medicamento coadministrado, efeitos com risco à vida e/ou morte súbita. Os medicamentos que são contraindicados, não recomendados ou que devem ser usados com cautela em combinação com o itraconazol estão descritos no item “Interações medicamentosas”.

Hipersensibilidade cruzada

Existem informações limitadas a respeito da hipersensibilidade cruzada entre o itraconazol e outros agentes antifúngicos azóis. Deve-se ter cuidado na prescrição de **Sporanox**[®] cápsulas a pacientes com hipersensibilidade a outros agentes azóis.

Neuropatia

Se ocorrer neuropatia que possa ser atribuída a **Sporanox**[®] cápsulas, o tratamento deverá ser descontinuado.

Perda da audição

Perda da audição transitória ou permanente foi relatada em pacientes recebendo tratamento com itraconazol. Muitos destes relatos incluem administração concomitante de quinidina, que é contraindicada (vide “Contraindicações”). Geralmente, a perda de audição se resolve com a interrupção do tratamento, mas pode persistir em alguns pacientes.

Resistência cruzada

Na candidíase sistêmica, se houver suspeita de cepas das espécies de *Candida* resistentes ao fluconazol, não se pode assumir que elas sejam sensíveis ao itraconazol. Assim, recomenda-se um teste de sensibilidade antes de iniciar o tratamento com itraconazol.

Intercambialidade

Não é recomendado que **Sporanox**[®] cápsulas sejam intercambiados, porque a exposição ao medicamento é maior com a solução oral do que com a cápsula, mesmo quando a mesma dose do medicamento é administrada.

Efeitos hepáticos

Casos muito raros de hepatotoxicidade, incluindo alguns casos de insuficiência hepática aguda fatal, ocorreram com o uso de **Sporanox**[®]. A maioria destes casos envolveu pacientes com doença hepática pré-existente, tratados para indicações sistêmicas, que apresentavam outras condições clínicas significantes e/ou estavam recebendo outros medicamentos hepatotóxicos. Alguns pacientes não apresentavam fatores de risco evidentes para doença hepática. Alguns destes casos foram observados durante o primeiro mês de tratamento, incluindo alguns na primeira semana. Monitoramento da função hepática deve ser considerado em pacientes recebendo **Sporanox**[®]. Os pacientes devem ser instruídos a relatar imediatamente aos seus médicos sinais e sintomas sugestivos de hepatite tais como anorexia, náusea, vômito, fadiga, dor abdominal ou urina escura. Nestes pacientes, o tratamento deve ser interrompido imediatamente e testes de função hepática devem ser realizados.

Os dados disponíveis sobre o uso de itraconazol oral em pacientes com insuficiência hepática são limitados. Deve-se ter cautela quando o medicamento for administrado nesta população de pacientes. Recomenda-se que pacientes com insuficiência hepática sejam cuidadosamente monitorados quando estiverem recebendo itraconazol. Recomenda-se que a meia-vida de eliminação prolongada do itraconazol, observada em estudo clínico de dose oral única de itraconazol cápsulas em pacientes com cirrose, seja considerada para a tomada de decisão de iniciar o tratamento com outros medicamentos metabolizados pela CYP3A4.

Em pacientes com níveis anormais ou elevados de enzimas hepáticas, com doença hepática ativa ou que apresentaram toxicidade hepática com outros medicamentos, o tratamento com **Sporanox**[®] é fortemente desencorajado, exceto na presença de uma situação grave ou com risco à vida, onde o benefício esperado exceda o risco. Recomenda-se monitoramento da função hepática em pacientes com anormalidades pré-existent da função hepática ou naqueles que apresentaram toxicidade hepática com outros medicamentos (vide “Propriedades farmacocinéticas – Populações especiais, Insuficiência hepática”).

Este medicamento pode causar hepatotoxicidade. Por isso, requer uso cuidadoso, sob vigilância médica estrita e acompanhado por controles periódicos da função hepática.

Acidez gástrica diminuída

A absorção do itraconazol de **Sporanox**[®] cápsulas é afetada quando a acidez gástrica está diminuída. Em pacientes com acidez gástrica diminuída, quer por doença (por exemplo, acloridria) ou por medicação concomitante (por exemplo, pacientes tomando medicamentos que reduzem a acidez gástrica), é recomendado administrar **Sporanox**[®] cápsulas com uma bebida ácida (como refrigerante não dietético à base de

cola). A atividade antifúngica deve ser monitorada e a dose de itraconazol aumentada, se necessário (vide “Interações medicamentosas” e “Propriedades farmacocinéticas – Absorção”).

Pacientes pediátricos

Sporanox[®] não está aprovado para uso na população pediátrica (menores de 18 anos). O uso do medicamento não é recomendado para esta população.

Pacientes idosos

Os dados clínicos sobre o uso de **Sporanox**[®] cápsulas em pacientes idosos são limitados. O uso de **Sporanox**[®] cápsulas nestes pacientes só é recomendado se o potencial benefício superar os potenciais riscos. Em geral, recomenda-se que a seleção da dose para um paciente idoso seja levada em consideração, refletindo a maior frequência de diminuição da função hepática, renal ou cardíaca e da presença de doença concomitante ou outro tratamento medicamentoso.

Insuficiência renal

Dados limitados estão disponíveis sobre o uso oral de itraconazol em pacientes com insuficiência renal. A exposição ao itraconazol pode ser menor em alguns pacientes com insuficiência renal. Recomenda-se cautela quando o itraconazol for administrado em pacientes desta população, e um ajuste da dose pode ser considerado.

Pacientes imunocomprometidos

Em pacientes imunocomprometidos (por exemplo, pacientes neutropênicos, com AIDS ou transplantados), a biodisponibilidade oral de **Sporanox**[®] cápsulas pode estar reduzida. Portanto, a dose deve ser ajustada com base na resposta clínica destes pacientes.

Pacientes com risco de vida imediato por infecção fúngica sistêmica

Devido às propriedades farmacocinéticas (vide “Propriedades farmacocinéticas”), **Sporanox**[®] cápsulas não é recomendado para iniciar o tratamento em pacientes que apresentem risco de vida imediato por infecção fúngica sistêmica.

Pacientes com AIDS

Nos pacientes com AIDS que receberam recentemente tratamento para infecções fúngicas sistêmicas com **Sporanox**[®] cápsulas e com risco de recaída, o médico deve avaliar a necessidade de tratamento de manutenção.

Fibrose cística

Em pacientes com fibrose cística, variabilidade nos níveis terapêuticos de itraconazol foi observada com dose, no estado de equilíbrio, de itraconazol solução oral 2,5 mg/kg duas vezes ao dia. Concentrações no estado de equilíbrio > 250 ng/mL foram alcançadas em aproximadamente 50% dos pacientes maiores de 16 anos de idade, mas em nenhum paciente com menos de 16 anos de idade. Se um paciente não responde a **Sporanox**[®] cápsulas, deve-se considerar mudança para tratamento alternativo.

Gravidez, Lactação e Fertilidade

Gravidez (Categoria C)

Sporanox® não deve ser usado durante a gravidez exceto nos casos de risco de vida quando o benefício potencial para a mãe superar os potenciais danos ao feto (vide “Contraindicações”).

Mulheres férteis

Mulheres com potencial de engravidar utilizando **Sporanox®** cápsulas devem tomar precauções contraceptivas. Contracepção altamente efetiva deve ser mantida até o próximo período menstrual após término do tratamento com **Sporanox®**.

Lactação

Quantidades muito pequenas de itraconazol são excretadas no leite humano. Portanto, os benefícios esperados com o uso de **Sporanox®** cápsulas devem ser ponderados contra o risco potencial de se manter a lactação. Em caso de dúvida, a paciente não deverá amamentar.

Uso criterioso no aleitamento ou na doação de leite humano: O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.

Efeito sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas

Não foram conduzidos estudos para avaliar os efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. Ao dirigir veículos e operar máquinas, deve-se levar em consideração a possibilidade de ocorrência de reações adversas como tontura, transtornos visuais e perda da audição (vide “Reações adversas”), as quais podem ocorrer em alguns casos e devem ser levadas em consideração.

Dados de segurança pré-clínicos

O itraconazol foi testado em uma série padrão de estudos pré-clínicos de segurança.

Estudos de toxicidade aguda com itraconazol oral em camundongos, ratos, porquinho da Índia e cães (valores DL50 de >320, >320, >160 e >200 mg/kg, respectivamente) indicam uma ampla margem de segurança (4 a 16 vezes a dose humana máxima recomendada [DHMR] de 400 mg/dia com base em mg/m² para um peso corporal humano de 60 kg). Estudos de toxicidade dose oral repetida de três meses de duração em ratos e cães revelaram vários órgãos ou tecidos alvo: córtex adrenal, fígado e sistema fagocitário mononuclear, bem como distúrbios do metabolismo lipídico apresentando-se como células de xantoma em vários órgãos.

Em elevadas doses orais repetidas de 40 e 80 mg/kg/dia em ratos (1 e 2 vezes a DHMR com base em mg/m²/dia), as investigações histológicas do córtex adrenal mostraram edema reversível com hipertrofia celular da zona reticular e fasciculata, algumas vezes associado a adelgaçamento da zona glomerulosa. Alterações hepáticas reversíveis foram encontradas com 40 e 160 mg/kg/dia (1 a 4 vezes de DHMR com base em mg/m²/dia). Observaram-se discretas alterações nas células sinusoidais e vacuolização dos hepatócitos, esta última indicando disfunção celular, mas sem hepatite visível ou necrose hepatocelular. As alterações histológicas do sistema de fagocitose mononuclear foram caracterizadas principalmente por macrófagos com aumento de material proteináceo em vários tecidos parenquimatosos.

Observou-se densidade mineral óssea global menor em cães jovens, machos e fêmeas, após administração de doses orais repetidas de itraconazol 30 mg/kg/dia por 13 semanas. Nenhuma toxicidade foi observada até 20 mg/kg/dia (2 vezes a DHMR com base em mg/m²/dia).

Em três estudos de toxicologia dose oral repetida em ratos (de 3, 6 e 12 meses de duração), o itraconazol induziu defeitos ósseos em doses de 10 mg/kg/dia ou mais (0,2 vezes de MRHD com base em mg/m²/dia). Os defeitos induzidos incluíram redução da atividade da placa óssea, adelgaçamento da zona compacta dos grandes ossos e aumento da fragilidade óssea.

Carcinogenicidade e mutagenicidade

Itraconazol não apresentou evidências de potencial carcinogênico primário em camundongos tratados por via oral por 23 meses com doses de até 80 mg/kg/dia (aproximadamente 1 vez a dose máxima recomendada para humanos [DHMR] de 400 mg/dia, com base na comparação da

superfície corporal). Ratos machos tratados com 25 mg/kg/dia (0,6 vezes a DHMR, com base na comparação da superfície corporal) apresentaram uma incidência ligeiramente maior de sarcoma de tecidos moles. Esses sarcomas podem ter sido uma consequência da hipercolesterolemia, que é uma resposta de ratos, mas não de cães ou humanos, à administração crônica de itraconazol. Ratas tratadas com 50 mg/kg/dia (1,2 vezes a DHMR, com base na comparação da superfície corporal) tiveram um aumento na incidência de carcinoma de células escamosas do pulmão (2/50) em comparação ao grupo não tratado. Embora a ocorrência de carcinoma de células escamosas do pulmão tenha sido extremamente incomum em ratos não tratados, o aumento observado neste estudo não foi estatisticamente significativo. Não existem indicações de potencial mutagênico do itraconazol.

Toxicologia reprodutiva

Verificou-se que o itraconazol causou aumento dose-dependente na toxicidade materna, embriotoxicidade e teratogenicidade em ratos, com níveis de dosagem de aproximadamente 40-160 mg/kg/dia (1-4 vezes a DHMR, com base na comparação da superfície corporal), e em camundongos, com níveis de aproximadamente 80 mg/kg/dia (1 vez a DHMR, com base na comparação da superfície corporal). Foi demonstrado que o itraconazol atravessa a placenta em modelo de rato. Em ratos, a teratogenicidade consistiu em defeitos ósseos maiores; em camundongos, consistiu em encefalocele e/ou macroglossia. Não foram encontrados efeitos teratogênicos em coelhos até a dose oral repetida de 80 mg/kg/dia (4 vezes a DHMR com base na comparação da superfície corporal).

Fertilidade

Não há evidência de influência primária na fertilidade no tratamento com itraconazol de ratos machos ou fêmeas tratados por via oral com doses de até 40 mg/kg/dia (1 vez a DMHR, com base na comparação da superfície corporal), embora tenha ocorrido toxicidade parental nesse nível de dosagem. Sinais mais severos de toxicidade parental, incluindo morte, foram observados no nível de dose imediatamente superior, de 160 mg/kg/dia (4 vezes a DMHR, com base na superfície corporal).

Imunotoxicidade

Dois estudos orais de imunotoxicidade de dose repetida de 28 dias em camundongos fêmeas indicaram que itraconazol até 10 mg/kg/dia não afetou negativamente a resposta imune, enquanto na dose claramente tóxica de 40 mg/kg/dia (0,5 vezes MRHD com base em mg/m²/dia), foi observada uma ligeira tendência para uma resposta reduzida das células formadoras de placa. Nenhum potencial imunotóxico primário foi evidenciado nesses estudos.

Atenção: contém sacarose, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de diabetes. Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose. Este medicamento não deve ser usado por pessoas com insuficiência de sacarose-isomaltase.

Atenção: contém sacarose (tipo de açúcar) abaixo de 0,25g/cápsula dura.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O itraconazol é um medicamento com elevado potencial de interação. Os vários tipos de interação e as recomendações gerais associadas estão descritas abaixo. Além disso, é fornecida uma tabela com exemplos de medicamentos que podem interagir com itraconazol, organizada por família de medicamentos para facilitar a consulta.

O itraconazol é metabolizado principalmente pela CYP3A4. Outras substâncias que compartilham desta via metabólica ou que modificam a atividade da CYP3A4 podem influenciar a farmacocinética do itraconazol. A coadministração de itraconazol com indutores moderados ou potentes da CYP3A4 pode diminuir a biodisponibilidade do itraconazol e hidróxi-itraconazol a ponto de reduzir a eficácia. A coadministração com inibidores moderados ou potentes da CYP3A4 pode aumentar a biodisponibilidade de itraconazol, podendo resultar em efeitos farmacológicos aumentados ou prolongados do itraconazol.

A absorção do itraconazol a partir da formulação cápsula é menor em indivíduos com acidez gástrica reduzida. Medicamentos que reduzem a acidez gástrica prejudicam a absorção de itraconazol a partir das cápsulas de itraconazol. Para contrabalançar este efeito, recomenda-se administrar as cápsulas de itraconazol com uma bebida ácida (tal como refrigerante não dietético à base de cola) após coadministração com medicamentos que reduzem a acidez gástrica (vide “Advertências e precauções”).

O itraconazol e seu principal metabólito, hidróxi-itraconazol, são inibidores potentes da CYP3A4. O itraconazol é um inibidor dos transportadores de medicamentos glicoproteína-P e proteína de resistência ao câncer de mama (BCRP). O itraconazol pode inibir o metabolismo de medicamentos metabolizados pela CYP3A4 e pode inibir o transporte de medicamentos pela glicoproteína-P e/ou pela BCRP, podendo resultar no aumento das concentrações plasmáticas desses medicamentos e/ou dos seus metabólitos ativos quando estes são administrados com itraconazol. As elevadas concentrações plasmáticas podem aumentar ou prolongar tanto os efeitos terapêuticos como os adversos destes medicamentos. Para alguns medicamentos, a coadministração com itraconazol pode resultar em concentrações plasmáticas diminuídas do medicamento ou de sua fração ativa, podendo resultar em eficácia reduzida do medicamento.

Após interrupção do tratamento clínico com itraconazol, as concentrações plasmáticas diminuem abaixo do limite de detecção dentro de 7 a 14 dias, dependendo da dose e duração do tratamento. Em pacientes com cirrose hepática ou recebendo inibidores da CYP3A4, as concentrações plasmáticas diminuem mais lentamente. Isto é particularmente importante e deve ser levado em consideração quando se inicia a terapia com medicamentos cujo metabolismo seja afetado pelo itraconazol.

As seguintes recomendações gerais se aplicam, a menos que indicado de forma diferente na tabela.

- **Contraindicado:** Em nenhuma circunstância o medicamento deve ser coadministrado com itraconazol. Isso se aplica a:

Substratos da CYP3A4 para os quais as concentrações plasmáticas aumentadas possam aumentar ou prolongar os efeitos terapêuticos e/ou adversos em tal extensão a ponto de acarretar uma situação potencialmente grave (vide “Contraindicações”).

- **Não recomendado:** Recomenda-se que o uso do medicamento seja evitado, a menos que os benefícios superem os riscos potencialmente maiores. Se a coadministração não puder ser evitada, recomenda-se monitoração clínica, e adaptação da dosagem de itraconazol e/ou do medicamento coadministrado conforme necessário. Quando apropriado, recomenda-se que as concentrações plasmáticas sejam medidas. Isso se aplica a:

- Indutores moderados ou potentes da CYP3A4: não recomendados a partir de 2 semanas antes e durante o tratamento com itraconazol;

- Substratos da CYP3A4/P-gp/BCRP para os quais as concentrações plasmáticas aumentadas ou diminuídas resultem em risco significativo: não recomendado durante e até 2 semanas após o tratamento com itraconazol.

- **Uso com cautela:** recomenda-se monitoração cuidadosa quando o medicamento é coadministrado com itraconazol. Após administração concomitante, recomenda-se que os pacientes sejam cuidadosamente monitorados e que a dosagem de itraconazol e/ou do medicamento coadministrado seja adaptada quando necessário. Quando apropriado, recomenda-se que as concentrações plasmáticas sejam avaliadas. Isso se aplica a:

- Medicamentos que reduzem a acidez gástrica (somente para cápsulas de itraconazol);

- Inibidores moderados ou potentes da CYP3A4;

- Substratos da CYP3A4/P-gp/BCRP para os quais as concentrações plasmáticas aumentadas ou diminuídas resultem em risco clinicamente relevante.

A lista de exemplos de medicamentos que interagem na tabela abaixo não é abrangente e, portanto, o rótulo de cada medicamento coadministrado com itraconazol deve ser consultado para obter informações relacionadas à via de metabolismo, vias de interação, riscos potenciais e ações específicas a serem tomadas no que diz respeito à coadministração. Os medicamentos descritos nesta tabela são baseados em estudos de interação com medicamentos, relatos de casos ou interações potenciais com base no mecanismo de interação.

Exemplos de Classes terapêuticas	Efeito esperado/potencial nos níveis do medicamento (vide notas de rodapé para informações adicionais)	Comentários clínicos (vide acima para informações adicionais)
Alfabloqueadores		
alfuzosina silodosina tansulosina	alfuzosina $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a silodosina $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a tansulosina $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a	Não recomendado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas ^c relacionadas à alfuzosina/silodosina/tansulosina.
Analgésicos		
alfentanila buprenorfina (IV e sublingual) oxicodona sufentanila	alfentanila AUC ($\uparrow\uparrow$ a $\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$) ^a buprenorfina $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a oxicodona $C_{\text{máx}}$ $\uparrow$, AUC $\uparrow\uparrow$ sufentanila aumento da concentração (extensão desconhecida) ^{a,b}	Utilizar com cautela, monitorar as reações adversas relacionadas ao analgésico ^c , pode ser necessária redução da dose de alfentanila/buprenorfina/oxicodona/sufentanila.
fentanila	fentanila IV AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a outras formulações de fentanila: aumento da concentração (extensão desconhecida) ^{a,b}	Não recomendado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas ^c relacionadas à fentanila.
levacetilmetadol (levometadil)	levacetilmetadol $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow\uparrow$) ^a	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas ao levacetilmetadol, tais como prolongamento do intervalo QT e Torsade de Pointes (TdP).
metadona	(R)-metadona $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow$) ^a	Contraindicado durante e por 2 semanas após o tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à metadona, tais como depressão respiratória potencialmente fatal, prolongamento do intervalo QT e Torsade de Pointes (TdP).
Antiarrítmicos		
digoxina	digoxina $C_{\text{máx}}$ $\uparrow$, AUC $\uparrow$	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas relacionadas à digoxina, pode ser necessário redução da dose de digoxina ^c .
disopiramida	aumento da concentração de disopiramida ($\uparrow\uparrow$) ^{a,b}	Contraindicado durante e por 2 semanas após o tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à disopiramida, tais como arritmias graves, incluindo Torsade de Pointes (TdP).
dofetilida	dofetilida $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow$) ^a	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à dofetilida, tais como arritmias ventriculares graves, incluindo Torsade de Pointes (TdP).
dronedarona	dronedarona $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow\uparrow\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$) ^a	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à dronedarona, tais como prolongamento do intervalo QT e morte cardiovascular.

Exemplos de Classes terapêuticas	Efeito esperado/potencial nos níveis do medicamento (vide notas de rodapé para informações adicionais)	Comentários clínicos (vide acima para informações adicionais)
quinidina	quinidina $C_{\text{máx}}$ ↑, AUC ↑↑	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à quinidina, tais como prolongamento do intervalo QT, Torsade de Pointes (TdP), hipotensão, confusão e delírio.
Antibacterianos		
bedaquilina	bedaquilina $C_{\text{máx}}$ (↔), AUC (↑) durante 2 semanas de bedaquilina uma vez ao dia ^a	Não recomendada coadministração por mais do que 2 semanas a qualquer momento durante uso de bedaquilina: aumento do risco de reações adversas relacionadas à bedaquilina.
ciprofloxacino eritromicina	itraconazol $C_{\text{máx}}$ ↑, AUC ↑	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas relacionadas ao itraconazol, pode ser necessário redução da dose de itraconazol.
claritromicina	Aumento da concentração de claritromicina (extensão desconhecida) ^{a,b} itraconazol $C_{\text{máx}}$ ↑, AUC ↑	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas relacionadas ao itraconazol e/ou claritromicina ^c , pode ser necessário redução da dose de itraconazol e/ou claritromicina.
delamanida trimetrexato	Aumento da concentração de delamanida (extensão desconhecida) ^{a,b} Aumento da concentração de trimetrexato (extensão desconhecida) ^{a,b}	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas relacionadas à delamanida/trimetrexato ^c , pode ser necessário redução da dose de delamanida ou do trimetrexato ^c .
isoniazida rifampicina	isoniazida: redução da concentração de itraconazol (↓↓↓) ^{a,b} rifampicina: itraconazol AUC ↓↓↓	Não recomendado 2 semanas antes e durante o tratamento com itraconazol. A eficácia de itraconazol pode ser reduzida.
rifabutina	Aumento da concentração de rifabutina (extensão desconhecida) ^{a,b} itraconazol: $C_{\text{máx}}$ ↓↓, AUC ↓↓	Não recomendado 2 semanas antes, durante e por 2 semanas após o tratamento com itraconazol. A eficácia de itraconazol pode ser reduzida e aumento do risco de reações adversas relacionadas à rifabutina ^c .
telitromicina	Em indivíduos saudáveis: telitromicina $C_{\text{máx}}$ ↑, AUC ↑ Em insuficiência renal grave: telitromicina AUC (↑↑) ^a Em insuficiência hepática grave: aumento da concentração de telitromicina (extensão desconhecida) ^{a,b}	Contraindicado em pacientes com insuficiência renal ou hepática durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à telitromicina ^c , tais como hepatotoxicidade, prolongamento do intervalo QT e Torsade de Pointes (TdP). Uso com cautela em outros pacientes: monitorar reações adversas à telitromicina, pode ser necessário redução da dose de telitromicina.
Medicamentos anticoagulantes e antiplaquetários		
apixabana edoxabana rivaroxabana vorapaxar	apixabana $C_{\text{máx}}$ (↑), AUC (↑) ^a edoxabana $C_{\text{máx}}$ (↑), AUC (↑) ^a rivaroxabana $C_{\text{máx}}$ (↑), AUC (↑ a ↑↑) ^a vorapaxar $C_{\text{máx}}$ (↑), AUC (↑) ^a	Não recomendado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas ^c relacionadas à apixabana/edoxabana/rivaroxabana/vorapaxar.

Exemplos de Classes terapêuticas	Efeito esperado/potencial nos níveis do medicamento (vide notas de rodapé para informações adicionais)	Comentários clínicos (vide acima para informações adicionais)
cumarínicos (exemplo, varfarina) cilostazol	cumarínicos (exemplo, varfarina) Aumento da concentração (extensão desconhecida) ^{a,b} cilostazol C _{máx} (↑), AUC (↑↑) ^a	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas relacionadas a cumarínicos/cilostazol ^c , pode ser necessário redução da dose de cumarínicos/cilostazol.
dabigatrana	dabigatrana C _{máx} (↑↑), AUC (↑↑) ^a	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas relacionadas à dabigatrana, pode ser necessário redução da dose de dabigatrana ^c .
ticagrelor	ticagrelor C _{máx} (↑↑), AUC (↑↑↑) ^a	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas ao ticagrelor, tal como sangramento.
Medicamentos anticonvulsivantes		
carbamazepina	(↑) ^{a,b} concentração da carbamazepina (↓↓) ^{a,b} concentração de itraconazol	Não recomendado 2 semanas antes, durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Eficácia do itraconazol pode ser reduzida e aumento do risco de reações adversas ^c relacionadas à carbamazepina.
fenobarbital fenitoína	fenobarbital: (↓↓↓) ^{a,b} concentração de itraconazol fenitoína: itraconazol AUC ↓↓↓	Não recomendado 2 semanas antes, durante o tratamento com itraconazol. Eficácia do itraconazol pode ser reduzida.
Antidiabéticos		
repaglinida saxagliptina	repaglinida C _{máx} ↑, AUC ↑ saxagliptina C _{máx} (↑↑), AUC (↑↑) ^a	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas relacionadas à repaglinida/saxagliptina, pode ser necessário redução da dose de repaglinida/saxagliptina ^c .
Anti-helmínticos, antifúngicos e antiprotzoários		
arteméter lumefantrina quinina	arteméter C _{máx} (↑↑), AUC (↑↑) ^a lumefantrina C _{máx} (↑), AUC (↑) ^a quinina C _{máx} ↔, AUC ↑	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas relacionadas à arteméter/lumefantrina/quinina ^c . Consulte a bula para ações específicas a serem tomadas.
halofantrina	Aumento da concentração de halofantrina (extensão desconhecida) ^{a,b}	Contraindicado durante e por 2 semanas após o tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à halofantrina, tais como prolongamento do intervalo QT e arritmias fatais.
isavuconazol	isavuconazol C _{máx} (↔), AUC (↑↑↑) ^a	Contraindicado durante e por 2 semanas após o tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas ao isavuconazol, tais como reações adversas hepáticas, reações de hipersensibilidade e toxicidade embriofetal.
praziquantel	praziquantel C _{máx} (↑↑), AUC (↑) ^a	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas relacionadas ao praziquantel ^c , pode ser necessário redução da dose de praziquantel.
Anti-histamínicos		

Exemplos de Classes terapêuticas	Efeito esperado/potencial nos níveis do medicamento (vide notas de rodapé para informações adicionais)	Comentários clínicos (vide acima para informações adicionais)
astemizol	astemizol $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas ao astemizol, tais como prolongamento do intervalo QT, Torsade de Pointes (TdP) e outras arritmias ventriculares.
bilastina ebastina rupatadina	bilastina $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow\uparrow$), AUC ($\uparrow$) ^a ebastina $C_{\text{máx}}$ $\uparrow\uparrow$, AUC $\uparrow\uparrow\uparrow$ Aumento da concentração de rupatadina ($\uparrow\uparrow\uparrow$) ^{a,b}	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas relacionadas à bilastina/ebastina/rupatadina ^c , pode ser necessário redução da dose de bilastina/ebastina/rupatadina.
mizolastina	mizolastina $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow$) ^a	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à mizolastina, tal como prolongamento do intervalo QT.
terfenadina	Aumento da concentração de terfenadina (extensão desconhecida) ^b	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à terfenadina, tais como prolongamento do intervalo QT, Torsade de Pointes (TdP) e outras arritmias ventriculares.
Medicamentos para enxaqueca		
eletriptana	eletriptana $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow\uparrow$) ^a	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c relacionadas à eletriptana, pode ser necessário redução da dose de eletriptana.
alcaloides do Ergot (tais como diidroergotamina, ergometrina, ergotamina, metilergometrina)	Aumento da concentração dos alcaloides do Ergot (extensão desconhecida) ^{a,b}	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas aos alcaloides do Ergot, tal como ergotismo.
Antineoplásicos		
bortezomibe brentuximabe vedotina bussulfano erlotinibe gefitinibe imatinibe ixabepilona nintedanibe panobinostat pemigatinibe ponatinibe ruxolitinibe sonidegibe tretinoína (oral) vandetanibe	bortezomibe AUC ($\uparrow$) ^a brentuximabe vedotina AUC ($\uparrow$) ^a bussulfano $C_{\text{máx}}$ $\uparrow$, AUC $\uparrow$ erlotinibe $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow\uparrow$), AUC ($\uparrow$) ^a gefitinibe $C_{\text{máx}}$ $\uparrow$, AUC $\uparrow$ imatinibe $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow$) ^a ixabepilona $C_{\text{máx}}$ ($\leftrightarrow$), AUC ($\uparrow$) ^a nintedanibe $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow$) ^a panobinostat $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow$) ^a pemigatinibe $C_{\text{máx}}$ $\uparrow$, AUC $\uparrow$ ponatinibe $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow$) ^a ruxolitinibe $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow$) ^a sonidegibe $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a tretinoína $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow$) ^a vandetanibe $C_{\text{máx}}$ ($\leftrightarrow$), AUC $\uparrow$	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c relacionadas a medicamentos antineoplásicos, pode ser necessário redução da dose dos medicamentos antineoplásicos.
idelalisibe	idelalisibe $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow$) ^a Aumento da concentração sérica de itraconazol (extensão desconhecida) ^{a,b}	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c relacionadas ao itraconazol e/ou idelalisibe, pode

Exemplos de Classes terapêuticas	Efeito esperado/potencial nos níveis do medicamento (vide notas de rodapé para informações adicionais)	Comentários clínicos (vide acima para informações adicionais)
		ser necessário redução da dose de itraconazol e/ou idelalisibe.
axitinibe bosutinibe cabazitaxel cabozantinibe ceritinibe cobimetinibe crizotinibe dabrafenibe dasatinibe docetaxel entrectinibe glasdegibe ibrutinibe lapatinibe nilotinibe olaparibe pazopanibe sunitinibe talazoparibe trabectedina trastuzumabe entansina	axitinibe $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a bosutinibe $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow\uparrow\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow\uparrow$) ^a cabazitaxel $C_{\text{máx}}$ ($\leftrightarrow$), AUC ($\leftrightarrow$) ^a cabozantinibe $C_{\text{máx}}$ ($\leftrightarrow$), AUC ($\uparrow$) ^a ceritinibe $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a cobimetinibe $C_{\text{máx}}$ $\uparrow\uparrow$, AUC $\uparrow\uparrow\uparrow$ crizotinibe $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a dabrafenibe AUC ($\uparrow$) ^a dasatinibe $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a docetaxel AUC ($\leftrightarrow$ a $\uparrow\uparrow$) ^a entrectinibe $C_{\text{máx}}$ $\uparrow$, AUC $\uparrow\uparrow\uparrow$ glasdegibe $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a ibrutinibe $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$) ^a lapatinibe $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a nilotinibe $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a olaparibe $C_{\text{máx}}$ $\uparrow$, AUC $\uparrow\uparrow$ pazopanibe $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow$) ^a sunitinibe $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow$) ^a talazoparibe $C_{\text{máx}}$ $\uparrow$, AUC $\uparrow$ trabectedina $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow$) ^a Aumento da concentração de trastuzumabe entansina (extensão desconhecida) ^{a,b}	Não recomendado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas ^c relacionadas a medicamentos antineoplásicos. Para cabazitaxel, apesar de alteração de parâmetros farmacocinéticos não ter atingido significância estatística em estudo de interação com dose reduzida do medicamento com cetoconazol, observou-se elevada variabilidade nos resultados. Para ibrutinibe, consulte a bula para ações específicas a serem tomadas.
alcaloides de vinca	Aumento da concentração dos alcaloides de vinca (extensão desconhecida) ^{a,b}	
regorafenibe	regorafenibe AUC ($\downarrow\downarrow$ por estimativa de fração ativa) ^a	Não recomendado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. A eficácia de regorafenibe pode ser reduzida.
irinotecano	Aumento da concentração do irinotecano e seu metabólito ativo (extensão desconhecida) ^{a,b}	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas ao irinotecano, tais como mielossupressão, com risco potencial de vida, e diarreia.
mobocertinibe	mobocertinibe $C_{\text{máx}}$ $\uparrow\uparrow$, AUC $\uparrow\uparrow\uparrow$	Contraindicado durante e por duas semanas após o tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas ao mobocertinibe ^c .
venetoclax	venetoclax $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow\uparrow\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow\uparrow$) ^a	Contraindicado para pacientes com leucemia linfocítica crônica/linfoma linfocítico de pequenas células durante a fase de início/titulação/aumento da dose de venetoclax. Caso contrário, não é recomendado durante e por 2 semanas após o tratamento com itraconazol. ^c
Antipsicóticos, ansiolíticos e hipnóticos		

Exemplos de Classes terapêuticas	Efeito esperado/potencial nos níveis do medicamento (vide notas de rodapé para informações adicionais)	Comentários clínicos (vide acima para informações adicionais)
alprazolam aripiprazol brotizolam buspirona cariprazina diazepam haloperidol midazolam (IV) perospirona quetiapina ramelteona risperidona suvorexanto zopiclona	alprazolam $C_{\text{máx}} \leftrightarrow$, AUC $\uparrow\uparrow$ aripiprazol $C_{\text{máx}} \uparrow$, AUC $\uparrow$ brotizolam $C_{\text{máx}} \leftrightarrow$, AUC $\uparrow\uparrow$ buspirona $C_{\text{máx}} \uparrow\uparrow\uparrow$, AUC $\uparrow\uparrow\uparrow$ cariprazina $(\uparrow\uparrow)^{a,b}$ diazepam $C_{\text{máx}} \uparrow\uparrow\uparrow$, AUC $\uparrow\uparrow\uparrow$ haloperidol $C_{\text{máx}} \uparrow$, AUC $\uparrow$ midazolam (IV) aumento da concentração $\uparrow\uparrow^b$ perospirona $C_{\text{máx}} \uparrow\uparrow\uparrow$, AUC $\uparrow\uparrow\uparrow$ quetiapina $C_{\text{máx}} (\uparrow\uparrow)$, AUC $(\uparrow\uparrow\uparrow)^a$ ramelteona $C_{\text{máx}} (\uparrow)$, AUC $(\uparrow)^a$ risperidona aumento da concentração $\uparrow^b$ suvorexanto $C_{\text{máx}} (\uparrow)$, AUC $(\uparrow\uparrow)^a$ zopiclona $C_{\text{máx}} \uparrow$, AUC $\uparrow$	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas relacionadas aos antipsicóticos, ansiolíticos ou hipnóticos ^c pode ser necessário redução da dose destes medicamentos.
lurasidona	lurasidona $C_{\text{máx}} (\uparrow\uparrow\uparrow)$, AUC $(\uparrow\uparrow\uparrow)^a$	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à lurasidona, tais como hipotensão, colapso circulatório, sintomas extrapiramidais graves, convulsões.
midazolam (oral)	midazolam (oral) $C_{\text{máx}} \uparrow$ a $\uparrow\uparrow$, AUC $\uparrow\uparrow$ a $\uparrow\uparrow\uparrow$	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas ao midazolam, tais como depressão respiratória, parada cardíaca, sedação prolongada e coma.
pimozida	pimozida $C_{\text{máx}} (\uparrow)$, AUC $(\uparrow\uparrow)^a$	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à pimozida, tais como arritmias cardíacas, possivelmente associadas ao prolongamento do intervalo QT e Torsade de Pointes (TdP).
sertindol	Aumento da concentração de sertindol (extensão desconhecida) ^{a,b}	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas ao sertindol, tais como prolongamento do intervalo QT e Torsade de Pointes (TdP).
triazolam	triazolam $C_{\text{máx}} \uparrow$ a $\uparrow\uparrow$, AUC $\uparrow\uparrow$ a $\uparrow\uparrow\uparrow$	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas ao triazolam, tais como convulsões, depressão respiratória, angioedema, apneia e coma.
Antivirais		
asunaprevir (potencializador)	asunaprevir $C_{\text{máx}} (\uparrow\uparrow\uparrow)$, AUC $(\uparrow\uparrow\uparrow)^a$	Utilizar com cautela, contudo, consulte a bula do medicamento antiviral para ações específicas a serem tomadas.
fumarato de tenofovir desoproxila (TDF)	Aumento da concentração de tenofovir (extensão desconhecida) ^{a,b}	

Exemplos de Classes terapêuticas	Efeito esperado/potencial nos níveis do medicamento (vide notas de rodapé para informações adicionais)	Comentários clínicos (vide acima para informações adicionais)
boceprevir	boceprevir $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a Aumento da concentração de itraconazol (extensão desconhecida) ^{a,b}	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c relacionadas ao itraconazol e/ou boceprevir, pode ser necessário redução da dose de itraconazol. Consulte a bula para ações específicas a serem tomadas.
cobicistate	Aumento da concentração de cobicistate (extensão desconhecida) ^{a,b} aumento da concentração de itraconazol (extensão desconhecida) ^{a,b}	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c relacionadas ao itraconazol, pode ser necessário redução da dose de itraconazol.
daclatasvir vaniprevir	daclatasvir $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a vaniprevir $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow\uparrow\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow\uparrow$) ^a	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c relacionadas ao daclatasvir/vaniprevir, pode ser necessário redução da dose de daclatasvir/vaniprevir.
darunavir (potencializado) fosamprenavir (potencializado com ritonavir)	darunavir potencializado com ritonavir: itraconazol $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a fosamprenavir potencializado com ritonavir: itraconazol $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas relacionadas ao itraconazol, pode ser necessário redução da dose de itraconazol.
elvitegravir (potencializado)	elvitegravir $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow$) ^a Aumento da concentração de itraconazol (extensão desconhecida) ^{a,b}	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c relacionadas ao itraconazol e/ou elvitegravir (potencializado com ritonavir). Pode ser necessário redução da dose de itraconazol. Consulte a bula para ações específicas a serem tomadas para elvitegravir.
efavirenz nevirapina	efavirenz: itraconazol $C_{\text{máx}}$ $\downarrow$, AUC $\downarrow$ nevirapina: itraconazol $C_{\text{máx}}$ $\downarrow$, AUC $\downarrow\downarrow$	Não recomendado nas 2 semanas antes e durante o tratamento com itraconazol. Eficácia do itraconazol pode ser reduzida.
elbasvir/grazoprevir	elbasvir $C_{\text{máx}}$ ($\leftrightarrow$), AUC ($\uparrow$) ^a grazoprevir $C_{\text{máx}}$ ($\leftrightarrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas relacionadas com os fármacos administrados concomitantemente ^c . Consulte a bula de elbasvir/grazoprevir para ações específicas a serem tomadas.
glecaprevir/pibrentasvir	glecaprevir $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$ a $\uparrow\uparrow\uparrow$) ^a pibrentasvir $C_{\text{máx}}$ ($\leftrightarrow$ a $\uparrow$), AUC ($\leftrightarrow$ a $\uparrow\uparrow$) ^a	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas relacionadas com os fármacos administrados concomitantemente ^c . Consulte as bulas de glecaprevir/pibrentasvir para ações específicas a serem tomadas.
indinavir	$\uparrow^b$ concentração de itraconazol indinavir $C_{\text{máx}}$ $\leftrightarrow$, AUC $\uparrow$	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c relacionadas ao itraconazol e/ou indinavir. Pode ser necessário redução da dose de itraconazol e/ou indinavir.

Exemplos de Classes terapêuticas	Efeito esperado/potencial nos níveis do medicamento (vide notas de rodapé para informações adicionais)	Comentários clínicos (vide acima para informações adicionais)
maraviroque	maraviroque $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow\uparrow$) ^a	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c . Pode ser necessário redução da dose de maraviroque.
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir com ou sem dasabuvir	itraconazol $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a ombitasvir $C_{\text{máx}}$ ($\leftrightarrow$), AUC ($\uparrow$) ^a paritaprevir $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a ritonavir $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow$) ^a dasabuvir $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow$) ^a	Utilizar com cautela, monitorar as reações adversas relacionadas ao itraconazol e/ou aos antivirais ^c , pode ser necessário reduzir a dose de itraconazol. Consulte as bulas dos medicamentos coadministrados para ações específicas a serem tomadas.
ritonavir	itraconazol $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a ritonavir $C_{\text{máx}}$ ($\leftrightarrow$), AUC ($\uparrow$) ^a	Utilizar com cautela, monitorar as reações adversas ^c ao itraconazol e/ou ritonavir. Pode ser necessário redução da dose de itraconazol. Consulte a bula para ações específicas a serem tomadas para ritonavir.
saquinavir	saquinavir (não potencializado) $C_{\text{máx}}$ $\uparrow\uparrow$, AUC $\uparrow\uparrow\uparrow$ itraconazol (com saquinavir potencializado) $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow$) ^a	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c ao itraconazol e/ou saquinavir. Pode ser necessário redução da dose de itraconazol. Consulte a bula para ações específicas a serem tomadas para saquinavir.
Betabloqueadores		
nadolol	nadolol $C_{\text{máx}}$ $\uparrow\uparrow$, AUC $\uparrow\uparrow$	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c ao nadolol. Pode ser necessário redução da dose de nadolol.
Bloqueadores dos canais de cálcio		
bepridil	Aumento da concentração de bepridil (extensão desconhecida) ^{a,b}	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas ao bepridil, tais como novas arritmias, taquicardia ventricular do tipo Torsade de Pointes (TdP).
diltiazem	Aumento da concentração de diltiazem & itraconazol (extensão desconhecida) ^{a,b}	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c relacionadas ao itraconazol e/ou diltiazem, pode ser necessário redução da dose de itraconazol e/ou diltiazem.
felodipino lercanidipino nisoldipino	felodipino $C_{\text{máx}}$ $\uparrow\uparrow\uparrow$, AUC $\uparrow\uparrow\uparrow$ lercanidipino AUC ($\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$) ^a nisoldipino $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$), AUC ($\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$) ^a	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à diidropiridina, tais como hipotensão e edema periférico.
outras diidropiridinas verapamil	Aumento da concentração da diidropiridina (extensão desconhecida) ^{a,b} aumento da concentração de verapamil (extensão desconhecida) ^{a,b}	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c à diidropiridina e/ou verapamil, pode ser necessário redução da dose da diidropiridina e/ou verapamil.
Inibidor de Miosina Cardíaca		
Mavacanteno	Mavacanteno $C_{\text{máx}}$ ($\uparrow$),	Contraindicado durante e por 2 semanas após o tratamento com itraconazol em pacientes

Exemplos de Classes terapêuticas	Efeito esperado/potencial nos níveis do medicamento (vide notas de rodapé para informações adicionais)	Comentários clínicos (vide acima para informações adicionais)
	AUC (↑), em metabolizadores normais e lentos da CYP2C19	metabolizadores lentos da CYP2C19 ou com fenótipo CYP2C19 desconhecido. Risco aumentado de reações adversas relacionadas ao mavacanteno, como insuficiência cardíaca, decorrente de disfunção sistólica.
Medicamentos cardiovasculares, Diversos		
alisquireno riociguat sildenafil (hipertensão pulmonar) tadalafila (hipertensão pulmonar)	alisquireno $C_{\text{máx}}$ ↑↑↑, AUC ↑↑↑ riociguat $C_{\text{máx}}$ (↑), AUC (↑↑) ^a Aumento da concentração de sildenafil/tadalafila (extensão desconhecida, mas o efeito pode ser maior do que o relatado com medicamentos urológicos) ^{a,b}	Não recomendado durante e nas 2 semanas após tratamento com itraconazol ^c . Risco aumentado de reações adversas relatadas para medicamentos cardiovasculares.
bosentana guanfacina	bosentana $C_{\text{máx}}$ (↑↑), AUC (↑↑) ^a guanfacina $C_{\text{máx}}$ (↑), AUC (↑↑) ^a	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c à bosentana e/ou guanfacina, pode ser necessário redução da dose de bosentana e/ou guanfacina.
ivabradina	ivabradina $C_{\text{máx}}$ (↑↑), AUC (↑↑↑) ^a	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à ivabradina, tais como fibrilação atrial, bradicardia, parada sinusal e bloqueio cardíaco.
ranolazina	ranolazina $C_{\text{máx}}$ (↑↑), AUC (↑↑) ^a	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à ranolazina, tais como prolongamento do intervalo QT e insuficiência renal.
Contraceptivos*		
dienogeste ulipristal	dienogeste $C_{\text{máx}}$ (↑), AUC (↑↑) ^a ulipristal $C_{\text{máx}}$ (↑↑), AUC (↑↑↑) ^a	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c a contraceptivos. Consulte a bula para ações específicas a serem tomadas para dienogeste/ulipristal.
Diuréticos		
eplerenona	eplerenona $C_{\text{máx}}$ (↑), AUC (↑↑↑) ^a	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à eplerenona, tais como hipercalemia e hipotensão.
finerenona	finerenona $C_{\text{máx}}$ (↑↑), AUC (↑↑↑) ^a	Contraindicado durante e por duas semanas após o tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à finerenona ^c .
Medicamentos gastrintestinais		
aprepitanto loperamida netupitanto	aprepitanto AUC (↑↑↑) ^a loperamida $C_{\text{máx}}$ ↑↑, AUC ↑↑ netupitanto $C_{\text{máx}}$ (↑), AUC (↑↑) ^a	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c ao aprepitanto/loperamida/netupitanto. Pode ser necessário redução da dose de

Exemplos de Classes terapêuticas	Efeito esperado/potencial nos níveis do medicamento (vide notas de rodapé para informações adicionais)	Comentários clínicos (vide acima para informações adicionais)
		aprepitanto/loperamida. Consulte a bula para ações específicas a serem tomadas para netupitanto.
cisaprida	Aumento da concentração de cisaprida (extensão desconhecida) ^{a,b}	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à cisaprida, tais como eventos cardiovasculares graves incluindo prolongamento do intervalo QT, arritmias ventriculares graves e Torsade de Pointes (TdP).
domperidona	domperidona $C_{\max}$ ↑↑, AUC ↑↑	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à domperidona, tais como arritmias ventriculares graves e morte cardíaca repentina.
medicamentos que reduzem a acidez gástrica	itraconazol: $C_{\max}$ ↓↓, AUC ↓↓	Utilizar com cautela: Medicamentos que reduzem a acidez gástrica: por ex, medicamentos neutralizadores de ácido, como hidróxido de alumínio ou supressores de secreção ácida, como antagonistas do receptor H2 e inibidores da bomba de próton. Quando tratamento concomitante com medicamentos neutralizadores de ácidos (ex., hidróxido de alumínio) estes devem ser administrados pelo menos 2 horas antes ou 2 horas após ingestão de Sporanox ® cápsulas (vide “Advertências e precauções”).
naloxegol	naloxegol $C_{\max}$ (↑↑↑), AUC (↑↑↑↑) ^a	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas ao naloxegol, tais como sintomas de abstinência a opioides.
<i>Saccharomyces boulardii</i>	<i>Saccharomyces boulardii</i> diminuição da colonização (extensão desconhecida)	Não recomendado durante e nas 2 semanas após tratamento com itraconazol. A eficácia de <i>Saccharomyces boulardii</i> pode ser reduzida.
Imunossupressores		
budesonida	budesonida (inalação) $C_{\max}$ ↑, AUC ↑↑	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c a imunossupressores. Pode ser necessário redução da dose de imunossupressores.
ciclesonida	budesonida (outras formas) aumento da concentração (extensão desconhecida) ^{a,b}	
ciclosporina	ciclesonida (inalação) $C_{\max}$ (↑↑), AUC (↑↑) ^a	
	ciclosporina (IV) aumento da concentração ↔ a ↑ ^b	
	ciclosporina (outras formas) aumento da concentração (extensão desconhecida) ^{a,b}	
dexametasona	dexametasona $C_{\max}$ ↔ (IV) ↑ (oral), AUC ↑↑ (IV, oral)	
fluticasona	fluticasona (inalação) aumento da concentração ↑↑ ^b	

Exemplos de Classes terapêuticas	Efeito esperado/potencial nos níveis do medicamento (vide notas de rodapé para informações adicionais)	Comentários clínicos (vide acima para informações adicionais)
metilprednisolona tacrolimo tensirolimo	fluticasona (nasal) aumento da concentração (↑) ^{a,b} metilprednisolona (oral) C _{máx} ↑ a ↑↑, AUC ↑↑ metilprednisolona (IV) AUC ↑↑ tacrolimo (IV) aumento da concentração ↑ ^b tacrolimo (oral) C _{máx} (↑↑), AUC (↑↑) ^a tensirolimo (IV) C _{máx} (↑↑), AUC (↑↑) ^a	
everolimo sirolimo (rapamicina)	everolimo C _{máx} (↑↑), AUC (↑↑↑) ^a sirolimo C _{máx} (↑↑), AUC (↑↑↑) ^a	Não recomendado durante e nas 2 semanas após tratamento com itraconazol ^c . Aumento do risco de reações adversas relacionadas ao everolimo /sirolimo ^c .
voclosporina	voclosporina C _{máx} (↑↑↑), AUC (↑↑↑) ^a	Contraindicado durante e por duas semanas após o tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à voclosporina ^c .
Medicamentos reguladores de lipídeos		
atorvastatina	atorvastatina C _{máx} ↔ a ↑↑, AUC ↑ a ↑↑	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c à atorvastatina. Pode ser necessário redução da dose de atorvastatina.
lomitapida	lomitapida C _{máx} (↑↑↑↑), AUC (↑↑↑↑) ^a	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à lomitapida, tais como hepatotoxicidade e reações gastrointestinais graves.
lovastatina sinvastatina	lovastatina C _{máx} ↑↑↑↑, AUC ↑↑↑↑ sinvastatina C _{máx} ↑↑↑↑, AUC ↑↑↑↑	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à lovastatina/sinvastatina, tais como miopatia, rabdomiólise e alterações nas enzimas hepáticas.
Medicamentos anti-inflamatórios não-esteroidais		
meloxicam	meloxicam C _{máx} ↓↓, AUC ↓	Utilizar com cautela, monitorizar redução de eficácia do meloxicam, poderá ser necessário adaptação da dose do meloxicam.
Medicamentos respiratórios		
salmeterol	salmeterol C _{máx} (↑), AUC (↑↑↑↑) ^a	Não recomendado durante e nas 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas ^c relacionadas ao salmeterol.
ISRS, antidepressivos tricíclicos e relacionados		
reboxetina venlafaxina	reboxetina C _{máx} (↔), AUC (↑) ^a venlafaxina C _{máx} (↑), AUC (↑) ^a	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c à reboxetina/venlafaxina. Pode ser necessário redução da dose de reboxetina/venlafaxina.
Medicamentos urológicos		
avanafila	avanafila C _{máx} (↑↑), AUC (↑↑↑↑) ^a	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à avanafila, tais

Exemplos de Classes terapêuticas	Efeito esperado/potencial nos níveis do medicamento (vide notas de rodapé para informações adicionais)	Comentários clínicos (vide acima para informações adicionais)
		como priapismo, problemas visuais e perda repentina da audição.
dapoxetina	dapoxetina $C_{\text{máx}}$ (↑), AUC (↑) ^a	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à dapoxetina, tais como hipotensão ortostática e efeitos oculares.
darifenacina vardenafila	darifenacina $C_{\text{máx}}$ (↑↑↑), AUC (↑↑↑ a ↑↑↑↑) ^a vardenafila $C_{\text{máx}}$ (↑↑), AUC (↑↑↑↑) ^a	Não recomendado durante e nas 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas ^c relacionadas à darifenacina/vardenafila.
dutasterida imidafenacina oxibutinina sildenafil (disfunção erétil) tadalafila (disfunção erétil e hiperplasia benigna prostática) tolterodina udenafila	Aumento da concentração da dutasterida (extensão desconhecida) ^{a,b} imidafenacina $C_{\text{máx}}$ ↑, AUC ↑ Aumento da concentração da oxibutinina ↑ ^b sildenafil $C_{\text{máx}}$ (↑↑), AUC (↑↑ a ↑↑↑↑) ^a tadalafila $C_{\text{máx}}$ (↑), AUC (↑↑) ^a tolterodina $C_{\text{máx}}$ (↑ a ↑↑), AUC (↑↑) ^a em metabolizadores fracos da CYP2D6 udenafila $C_{\text{máx}}$ (↑), AUC (↑↑) ^a	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c aos medicamentos urológicos. Pode ser necessário redução da dose de medicamentos urológicos; consulte a bula para ações específicas a serem tomadas para dutasterida. (Para sildenafil e tadalafila, vide também 'Medicamentos cardiovasculares', 'Medicamentos diversos e outras substâncias').
fesoterodina	fesoterodina $C_{\text{máx}}$ (↑↑), AUC (↑↑) ^a	Contraindicado em pacientes com insuficiência renal ou hepática moderada a grave, durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à fesoterodina, tal como efeitos anticolinérgicos graves. Utilizar com cautela em outros pacientes, monitorar reações adversas ^c à fesoterodina, pode ser necessário redução da dose de fesoterodina.
solifenacina	solifenacina $C_{\text{máx}}$ (↑), AUC (↑↑) ^a	Contraindicado em pacientes com insuficiência renal grave ou insuficiência hepática moderada a grave, durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à solifenacina, tais como efeitos anticolinérgicos e prolongamento do intervalo QT. Utilizar com cautela em outros pacientes, monitorar reações adversas ^c à solifenacina, pode ser necessário redução da dose de solifenacina.
Medicamentos diversos e outras substâncias		
alitretinoína (oral) cabergolina canabinoide cinacalcete	alitretinoína $C_{\text{máx}}$ (↑), AUC (↑) ^a cabergolina $C_{\text{máx}}$ (↑↑), AUC (↑↑) ^a Aumento da concentração do canabinoide (extensão desconhecida, mas provável(↑↑) ^a) cinacalcete $C_{\text{máx}}$ (↑↑), AUC (↑↑) ^a	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas à alitretinoína / cabergolina / canabinoide / cinacalcete, pode ser necessário redução da dose ^c de alitretinoína / cabergolina / canabinoide / cinacalcete.

Exemplos de Classes terapêuticas	Efeito esperado/potencial nos níveis do medicamento (vide notas de rodapé para informações adicionais)	Comentários clínicos (vide acima para informações adicionais)
valbenazina	valbenazina C _{max} (↑), AUC (↑↑) ^a	Use com cautela, monitore reações adversas ^c relacionadas à valbenazina, é necessária a redução da dose de valbenazina.
colchicina	colchicina C _{máx} (↑), AUC (↑↑) ^a	Contraindicado em pacientes com insuficiência renal ou hepática, durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas à colchicina, como diminuição do débito cardíaco, arritmias cardíacas, dificuldades respiratórias e depressão da medula óssea. Não recomendado em outros pacientes durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas ^c relacionadas à colchicina.
eliglustate	EMs da CYP2D6: eliglustate C _{máx} (↑↑), AUC (↑↑) ^a Maiores aumentos são esperados em IMs/PMs da CYP2D6 e após coadministração com um inibidor da CYP2D6.	Contraindicado em EMs da CYP2D6 que tomam um inibidor forte ou moderado da CYP2D6 / IMs e PMs da CYP2D6, durante e 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionados ao eliglustate, como prolongamento do intervalo PR, QTc e/ou QRS e arritmias cardíacas. Utilizar com cautela em metabolizadores extensivos da CYP2D6, monitorar reações adversas ^c ao eliglustate, pode ser necessário redução da dose do eliglustate.
alcaloides do Ergot	Aumento da concentração dos alcaloides do Ergot (extensão desconhecida) ^{a,b}	Contraindicado durante e por 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas relacionadas aos alcaloides do Ergot, como ergotismo. (vide também 'Medicamentos para enxaqueca').
galantamina	galantamina C _{máx} (↑), AUC (↑) ^a	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c à galantamina. Pode ser necessário redução da dose de galantamina.
ivacaftor	ivacaftor C _{máx} (↑↑), AUC (↑↑↑) ^a	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c ao ivacaftor, pode ser necessário redução da dose de ivacaftor.
Lonafarnibe	Lonafarnibe C _{máx} (↑↑), AUC (↑↑↑) ^{a, **}	Contraindicado durante o tratamento com itraconazol e por 2 semanas após sua descontinuação. Risco aumentado de toxicidade gastrointestinal (náusea, vômito e diarreia graves) e prolongamento do intervalo QT.
lumacaftor/ivacaftor	ivacaftor C _{máx} (↑↑), AUC (↑↑) ^a lumacaftor C _{máx} (↔), AUC (↔) ^a diminuição da concentração do itraconazol, extensão desconhecida, mas provável ↓↓↓	Não recomendado nas 2 semanas anteriores, durante e 2 semanas após tratamento com itraconazol. A eficácia de itraconazol pode ser reduzida e aumento do risco de reações adversas ^c relacionadas ao ivacaftor.

Exemplos de Classes terapêuticas	Efeito esperado/potencial nos níveis do medicamento (vide notas de rodapé para informações adicionais)	Comentários clínicos (vide acima para informações adicionais)
Palovaroteno	Palovaroteno C_{max} (↑↑), AUC (↑↑) ^{a, **}	Não recomendado durante o tratamento com itraconazol e por 2 semanas após sua descontinuação. Caso a coadministração seja inevitável, é necessária redução da dose. Consultar a bula do palovaroteno para orientações de dose.
Antagonistas do receptor de vasopressina		
conivaptana tolvaptana	conivaptana C_{max} (↑↑), AUC (↑↑↑) ^a tolvaptana C_{max} (↑↑), AUC (↑↑↑) ^a	Não recomendado durante e 2 semanas após tratamento com itraconazol. Aumento do risco de reações adversas ^c relacionadas à conivaptana/tolvaptana.
mozavaptana	mozavaptana C_{max} ↑, AUC ↑↑	Utilizar com cautela, monitorar reações adversas ^c à mozavaptana, pode ser necessário redução da dose de mozavaptana.

* Os inibidores da CYP3A4 (incluindo o itraconazol) podem aumentar as concentrações sistêmicas de hormônios contraceptivos.

**Com base em um estudo clínico de interação medicamentosa (DDI) com cetoconazol; espera-se que o itraconazol produza magnitude semelhante de interação.

EMs: metabolizadores extensivos; IMs: metabolizadores intermediários, PMs: metabolizadores fracos; TdP: Torsade de Pointes.

Observação:

Aumento médio:

- ↑: <100% (i.e. < 2 vezes)
- ↑↑: 100-400% (i.e. ≥ 2 vezes a <5 vezes)
- ↑↑↑: 400-900% (i.e. ≥ 5 vezes e < 10 vezes)
- ↑↑↑↑: ≥ 10 vezes

Diminuição média:

- ↓: < 40%
- ↓↓: 40-80%
- ↓↓↓: > 80%

Sem efeito:

↔

Para o efeito (coluna do meio), é indicado o nome do medicamento original, mesmo quando o efeito estiver relacionado à fração ativa ou ao metabólito ativo de um medicamento.

^a Para os medicamentos com setas entre colchetes, a avaliação baseou-se no mecanismo de interação e na informação clínica de interação do medicamento com cetoconazol, outros inibidores potentes da CYP3A4 e/ou inibidores da glicoproteína-P ou BCRP, em técnicas de modelagem, relatos de casos e/ou dados in vitro. Para os demais medicamentos, a avaliação baseou-se na informação clínica de interação do medicamento com itraconazol.

^b Os parâmetros farmacocinéticos não estavam disponíveis.

^c Consulte a bula correspondente para informações sobre reações adversas relacionadas ao medicamento.

7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Conservar as embalagens em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegidas da luz e umidade.

Este medicamento tem validade de 36 meses a partir da data de sua fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Aspecto Físico

As cápsulas de **Sporanox**[®] são de gelatina, com tampa de cor azul opaco e corpo rosa transparente, preenchidas por pequenas esferas de cor creme que contêm itraconazol.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

Sporanox[®] deve ser administrado por via oral.

Para se obter um grau máximo de absorção, **Sporanox**[®] cápsulas deve ser administrado imediatamente após uma refeição. As cápsulas devem ser ingeridas inteiras.

Indicação ginecológica		
INDICAÇÃO	DOSE	DURAÇÃO DO TRATAMENTO
Tratamento de candidíase vulvovaginal	200 mg duas vezes ao dia ou 200 mg uma vez ao dia	1 dia ou 3 dias

Indicações dermatológicas/ mucosas/ oftalmológicas		
INDICAÇÃO	DOSE	DURAÇÃO do Tratamento
Tratamento de dermatomicose	200 mg uma vez ao dia ou 100 mg uma vez ao dia	7 dias ou 15 dias
Tratamento de dermatomicose em regiões altamente queratinizadas, como palma das mãos e planta dos pés	200 mg duas vezes ao dia ou 100 mg uma vez ao dia	7 dias ou 30 dias
Tratamento de pitíriase versicolor	100 mg duas vezes ao dia ou 200 mg uma vez ao dia	7 dias
Tratamento de candidíase oral	100 mg uma vez ao dia	15 dias
Tratamento de ceratite fúngica	200 mg uma vez ao dia	21 dias A duração do tratamento deve ser ajustada de acordo com a resposta clínica.

Onicomicose causadas por dermatófitos e/ou leveduras																																							
Onicomicose Pulsoterapia				Dose e duração do tratamento																																			
				Pulsoterapia consiste na administração de duas cápsulas (200 mg duas vezes ao dia) durante uma semana. Recomendam-se dois pulsos para infecções nas unhas das mãos e três pulsos para infecções nas unhas dos pés. Tratamentos em pulso são sempre separados por intervalos de 3 semanas sem medicamento. A resposta clínica se tornará evidente à medida que a unha crescer após a descontinuação do tratamento.																																			
<table><tr><td>Local afetado</td><td>Semana 1</td><td>Semana 2</td><td>Semana 3</td><td>Semana 4</td><td>Semana 5</td><td>Semana 6</td><td>Semana 7</td><td>Semana 8</td><td>Semana 9</td></tr><tr><td>Unhas do pé com ou sem envolvimento das unhas da mão</td><td>Pulso 1</td><td colspan="3">Semanas livres de itraconazol</td><td>Pulso 2</td><td colspan="3">Semanas livres de itraconazol</td><td>Pulso 3</td></tr><tr><td>Unhas da mão apenas</td><td>Pulso 1</td><td colspan="3">Semanas livres de itraconazol</td><td>Pulso 2</td><td colspan="4"></td></tr></table>										Local afetado	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Unhas do pé com ou sem envolvimento das unhas da mão	Pulso 1	Semanas livres de itraconazol			Pulso 2	Semanas livres de itraconazol			Pulso 3	Unhas da mão apenas	Pulso 1	Semanas livres de itraconazol			Pulso 2				
Local afetado	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9																														
Unhas do pé com ou sem envolvimento das unhas da mão	Pulso 1	Semanas livres de itraconazol			Pulso 2	Semanas livres de itraconazol			Pulso 3																														
Unhas da mão apenas	Pulso 1	Semanas livres de itraconazol			Pulso 2																																		
Onicomicose Tratamento contínuo				Dose		Duração do tratamento																																	
Unhas do pé com ou sem envolvimento das unhas da mão				200 mg uma vez ao dia		3 meses																																	

A eliminação do itraconazol do tecido cutâneo e ungueal é mais lenta que a do plasma. Assim, a resposta clínica e micológica ideal é alcançada 2 a 4 semanas após descontinuação do tratamento das infecções cutâneas e 6 a 9 meses após descontinuação das infecções das unhas.

Micoses sistêmicas			
INDICAÇÃO	DOSE	DURAÇÃO MÉDIA DO TRATAMENTO ¹	OBSERVAÇÕES
Tratamento de aspergilose	200 mg uma vez ao dia.	2 - 5 meses	Aumentar a dose para 200 mg duas vezes ao dia em caso de doença invasiva ou disseminada.
Tratamento de candidíase	100 - 200 mg uma vez ao dia	3 semanas - 7 meses	Aumentar a dose para 200 mg duas vezes ao dia em caso de doença invasiva ou disseminada.
Profilaxia de infecções fúngicas em pacientes imunocomprometidos com neutropenia grave	200 mg uma vez ao dia	Até recuperação imune ²	Iniciar 1-3 dias antes ou no início da quimioterapia até a melhora da neutropenia
Tratamento de criptococose não-meningeana	200 mg uma vez ao dia	2 meses - 1 ano	
Tratamento de meningite criptocócica	200 mg duas vezes ao dia		
Meningite criptocócica (terapia de manutenção apenas em pacientes com AIDS)	200 mg uma vez ao dia	Até recuperação imune ²	

Tratamento de histoplasmose	200 mg uma vez ao dia ou 200 mg duas vezes ao dia	8 meses	
Histoplasmose (terapia de manutenção apenas em pacientes com AIDS)	200 mg uma vez ao dia ou 200 mg duas vezes ao dia	Até recuperação imune ²	
Talaromicose (anteriormente, Peniciliose) (terapia de manutenção apenas em pacientes com AIDS)	200 mg uma vez ao dia ou 200 mg duas vezes ao dia	Até recuperação imune ²	
Tratamento de blastomicose	100 mg uma vez ao dia ou 200 mg duas vezes ao dia	6 meses	
Tratamento de esporotricose linfocutânea e cutânea	100 ou 200 mg uma vez ao dia (lesões localizadas) ou 200 mg duas vezes ao dia (lesões extensas)	3 a 6 meses	
Tratamento de esporotricose extracutânea	200 mg duas vezes ao dia	12 meses	
Tratamento de paracoccidiodomicose	100 mg uma vez ao dia	6 meses	Dados de eficácia de Sporanox [®] cápsulas nesta dose para tratamento de paracoccidiodomicose em pacientes com AIDS não estão disponíveis.
Tratamento de cromoblastomicose (anteriormente conhecido como cromomicose)	200 mg uma vez ao dia	6 meses	

¹ A duração do tratamento deve ser ajustada de acordo com a resposta clínica.

² A duração do tratamento deve basear-se no estado da recuperação imunitária

Doses perdidas

- Se você esqueceu uma dose de **Sporanox**[®], tome-a assim que se lembrar. Isso ajudará a manter uma quantidade constante do medicamento no seu sangue.
- Mas, se estiver quase na hora da sua próxima dose, pule a dose esquecida e continue com a próxima dose agendada. Não tome duas doses ao mesmo tempo para compensar uma dose esquecida.

Populações especiais

Pacientes pediátricos

Sporanox[®] não está aprovado para uso na população pediátrica (menores de 18 anos). O uso do medicamento não é recomendado para esta população.

Pacientes idosos

Dados clínicos sobre o uso de **Sporanox**[®] em pacientes idosos são limitados. O uso de **Sporanox**[®] cápsulas nestes pacientes só é recomendado se o potencial benefício superar os potenciais riscos. Em geral, recomenda-se que ao selecionar a dose para um paciente idoso seja levado em consideração a maior frequência de diminuição da função hepática, renal ou cardíaca, a presença de doenças concomitantes ou outro tratamento medicamentoso (vide “Advertências e precauções”).

Insuficiência hepática

São limitados os dados disponíveis sobre uso de itraconazol oral em pacientes com insuficiência hepática. Este medicamento deve ser administrado com cautela em pacientes desta população (vide “Propriedades farmacocinéticas – Populações especiais, Insuficiência hepática”).

Insuficiência renal

São limitados os dados disponíveis sobre o uso oral de itraconazol em pacientes com insuficiência renal. A exposição ao itraconazol pode ser menor em alguns pacientes com insuficiência renal. Recomenda-se cautela quando este medicamento for administrado em pacientes nesta população e ajuste de dose pode ser necessário.

Acidez gástrica diminuída

Em pacientes com acidez gástrica diminuída, recomenda-se administrar as cápsulas de **Sporanox**[®] com uma bebida ácida (como um refrigerante não dietético, à base de cola) (vide “Advertências e Precauções”).

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

9. REAÇÕES ADVERSAS

Neste item são apresentadas as reações adversas. Reações adversas são eventos adversos que foram considerados como razoavelmente associados ao uso do itraconazol, com base na avaliação abrangente da informação disponível sobre eventos adversos. Relação causal com itraconazol não pode ser estabelecida de forma confiável em casos individuais. Além disso, como os estudos clínicos são conduzidos sob condições amplamente variáveis, as taxas de reações adversas observadas nos estudos clínicos de um medicamento não podem ser comparadas diretamente às taxas de estudos clínicos de outro medicamento e podem não refletir as taxas observadas na prática clínica.

Dados de estudos clínicos

A segurança de **Sporanox**[®] cápsulas foi avaliada em 8499 pacientes que participaram de 107 estudos clínicos abertos e duplo-cegos. Dos 8499 pacientes tratados com **Sporanox**[®] cápsulas, 2104 pacientes foram tratados com **Sporanox**[®] cápsulas durante os estudos duplo-cegos. Todos os 8499 pacientes receberam pelo menos uma dose de **Sporanox**[®] cápsulas para tratamento de dermatomicoses ou onicomicoses e forneceram dados de segurança. Reações adversas relatadas por $\geq 1\%$ dos pacientes tratados com **Sporanox**[®] cápsulas nestes estudos clínicos são mostradas na Tabela 1.

Tabela 1: Reações adversas relatadas por $\geq 1\%$ dos pacientes tratados com **Sporanox[®] cápsulas em 107 estudos clínicos**

Classe de sistema/órgão Reação adversa	Sporanox [®] cápsulas % (N=8499)
Distúrbios do sistema nervoso Cefaleia	1,6
Distúrbios gastrintestinais	

Náusea	1,6
Dor abdominal	1,3

Reações adversas que ocorreram em < 1% dos pacientes tratados com **Sporanox**[®] cápsulas nestes estudos clínicos estão listadas na Tabela 2.

Tabela 2: Reações adversas relatadas por < 1% dos pacientes tratados com Sporanox[®] cápsulas em 107 estudos clínicos

Classe de sistema/órgão
Reação adversa
Infecções e infestações
Rinite, sinusite, infecção do trato respiratório superior
Distúrbios do sistema linfático e do sangue
Leucopenia
Distúrbios do sistema imunológico
Hipersensibilidade
Distúrbios do sistema nervoso
Disgeusia, hipoestesia, parestesia
Distúrbios do ouvido e do labirinto
Tinido
Distúrbios gastrintestinais
Constipação, diarreia, dispepsia, flatulência, vômito
Distúrbios hepatobiliares
Função hepática anormal, hiperbilirrubinemia
Distúrbios da pele e tecido subcutâneo
Prurido, erupção cutânea, urticária
Distúrbios renais e urinários
Polaciúria
Distúrbios das mamas e do sistema reprodutivo
Disfunção erétil, distúrbio da menstruação
Distúrbios gerais e condições no local de administração
Edema

A seguir, a lista de reações adversas adicionais associadas ao itraconazol reportadas nos estudos clínicos de **Sporanox**[®] solução oral e/ou **Sporanox**[®] intravenoso, excluindo a reação adversa “Inflamação no local da aplicação”, que é específico da via de administração injetável.

Distúrbios do sistema linfático e sanguíneo: granulocitopenia, trombocitopenia.

Distúrbios do sistema imunológico: reações anafiláticas.

Distúrbios nutricionais e de metabolismo: hiperglicemia, hipercalcemia, hipocalcemia, hipomagnesemia.

Distúrbios psiquiátricos: confusão mental.

Distúrbios do sistema nervoso: neuropatia periférica, tontura, sonolência.

Distúrbios cardíacos: insuficiência cardíaca, insuficiência ventricular esquerda, taquicardia.

Distúrbios vasculares: hipertensão, hipotensão.

Distúrbios respiratórios, torácicos e do mediastino: edema pulmonar, disfonia, tosse.

Distúrbios gastrintestinais: distúrbio gastrintestinal.

Distúrbios hepatobiliares: insuficiência hepática, hepatite, icterícia.

Distúrbios de pele e do tecido subcutâneo: erupção cutânea eritematosa, hiperidrose.

Distúrbios musculoesqueléticos e de tecido conjuntivo: mialgia, artralgia.

Distúrbios renais e urinários: insuficiência renal, incontinência urinária.

Distúrbios gerais e condições no local de administração: edema generalizado, edema de face, dor no peito, febre, dor, fadiga, calafrios.

Exames laboratoriais: aumento de alanina aminotransferase, aumento de aspartato aminotransferase, aumento de fosfatase alcalina, aumento de lactato desidrogenase, aumento de ureia, aumento de gama-glutamilttransferase, aumento de enzimas hepáticas, análise de urina anormal.

Experiência de pós-comercialização

Em adição às reações adversas relatadas durante os estudos clínicos e listadas anteriormente, as seguintes reações adversas foram relatadas durante a experiência de pós-comercialização (vide tabela 3). As frequências são fornecidas utilizando a seguinte convenção:

Muito comum ($\geq 1/10$); Comum ($\geq 1/100, < 1/10$); Incomum ($\geq 1/1000, < 1/100$); Rara ($\geq 1/10000, < 1/1000$); Muito rara ($< 1/10000$), incluindo relatos isolados.

Na tabela 3, as reações adversas são apresentadas por categoria de frequência baseada em taxas de relatos espontâneos.

Tabela 3: Reações adversas identificadas durante a experiência de pós-comercialização com Sporanox® por categoria de frequência estimada a partir de taxas de relatos espontâneos

Distúrbios do sistema imunológico Muito rara	Doença do soro, edema angioneurótico, reação anafilática
Distúrbios endócrinos	Pseudoaldosteronismo
Distúrbios nutricionais e do metabolismo Muito rara	Hipertrigliceridemia
Distúrbios do sistema nervoso Muito rara	Tremor
Distúrbios oftalmológicos Muito rara	Distúrbios visuais (incluindo diplopia e visão turva)
Distúrbios do ouvido e do labirinto Muito rara	Perda transitória ou permanente da audição
Distúrbios cardíacos Muito rara	Insuficiência cardíaca congestiva e Bradicardia
Distúrbios respiratórios, torácicos e do mediastino Muito rara	Dispneia
Distúrbios gastrintestinais Muito rara	Pancreatite
Distúrbios hepatobiliares Muito rara	Hepatotoxicidade grave (incluindo alguns casos de insuficiência hepática aguda fatal)
Distúrbios de pele e do tecido subcutâneo Muito rara	Necrólise epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, pustulose exantemática generalizada aguda, eritema multiforme, dermatite esfoliativa, vasculite leucocitoclástica, alopecia, fotossensibilidade
Exames laboratoriais Muito rara	Aumento da creatina fosfoquinase sanguínea

Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no portal da Anvisa.

10. SUPERDOSE

Sinais e sintomas

Em geral, os eventos adversos relatados com superdose foram consistentes com aqueles relatados com o uso do itraconazol (vide “Reações adversas”).

Tratamento

No caso de superdose, devem ser adotadas medidas de suporte.

É aconselhável contatar um centro de controle de intoxicações para determinar as mais recentes recomendações para o manuseio de uma superdose.

O itraconazol não pode ser removido por hemodiálise.

Não há antídoto específico.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Registro – 1.1236.0028

Farm. Resp.: Erika Diago Rufino – CRF/SP nº 57.310

Registrado por:

JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo – SP - CNPJ 51.780.468/0001-87

Produzido por:

Kenvue Ltda. - São José dos Campos – SP

Indústria Brasileira



® Marca Registrada

Venda sob prescrição

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 08/09/2026.



CCDS 2608

VPS TV 16.0

	HISTÓRICO DE BULAS										Johnson&Johnson Innovative Medicine
	Dados da submissão eletrônica				Dados da petição que altera bula				Dados das alterações de bula		
Produto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas	
Sporanox (itraconazol)	06/11/2014	0464663/14-1	10458 - MEDICAMENTO NOVO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	06/11/2014	0464663/14-1	10458 - MEDICAMENTO NOVO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	06/11/2014	VP: Todos VPS: Todos	VP01/VP01	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	11/07/2014	1004955/14-0	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	11/07/2014	1004955/14-0	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	11/07/2014	VP: 4 VPS: 6	VP02/VP02	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	06/02/2015	0485892/15-1	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/02/2015	0485892/15-1	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/02/2015	VP: 8 VPS: 9	VP03/VP03	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	10/11/2016	2377743/16-5	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	10/11/2016	2377743/16-5	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	10/11/2016	VP: Dizeres Legais VPS: Dizeres Legais	VP04/VP04	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	20/04/2017	0671441/17-2	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	20/04/2017	0671441/17-2	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	20/04/2017	VP: 4 e 8 VPS: 3, 6 e 9	VP05/VP05	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	29/09/2017	2044318/17-8	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	29/09/2017	2044318/17-8	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	29/09/2017	VP: 4 e 9 VPS: 5 e 10	VP06/VP06	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	21/08/2018	0821434/18-4	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	21/08/2018	0821434/18-4	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	21/08/2018	VP: 4 e 9 VPS: 3, 4, 5 e 6	VP07/VP07	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	05/03/2019	0397217/19-8	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	23/1/2019	0072099/19-2 0072100/19-0 0072108/19-5	11121 - RC 73/2016 - NOVO - Inclusão de nova indicação terapêutica 11192 - MEDICAMENTO NOVO - Exclusão de indicação terapêutica 11118 - RDC 73/2016 - NOVO - Alteração de posologia	05/03/2019	VP: 6 VPS: 1 e 8	VP08/VP08	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	20/11/2020	4099319/20-1	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	20/11/2020	4099319/20-1	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	20/11/2020	VP: Dizeres Legais VPS: 9, Dizeres Legais	VPTV2.0/VPSTV2.0	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	14/09/2021	3634330/21-0	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	14/09/2021	3634330/21-0	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	14/09/2021	VP: Identificação do Medicamento, Apresentações VPS: Identificação do medicamento, Apresentações	VPTV3.0/VPSTV3.0	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	23/02/2022	0676914/22-5	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	23/02/2022	0676914/22-5	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	23/02/2022	VP: 4 VPS: 6	VPTV4.0/VPSTV4.0	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	12/04/2022	2318204/22-5	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	12/04/2022	2318204/22-5	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	12/04/2022	VP: 4 VPS: 6	VPTV5.0/VPSTV5.0	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	20/09/2022	4717224/22-1	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	20/09/2022	4717224/22-1	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	20/09/2022	VP: 4 VPS: 6	VPTV6.0/VPSTV6.0	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	06/04/2023	0345809/23-8	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	06/04/2023	0345809/23-8	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	06/04/2023	VP: 4 VPS: 4 e 6	VPTV7.0/VPSTV7.0	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	13/07/2023	0725254/23-8	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	11/07/2023	0713443/23-6	11005 - RDC 73/2016 - NOVO - Alteração de razão social do local de fabricação do medicamento	11/07/2023	VP: Dizeres Legais VPS: Dizeres Legais	VPTV8.0/VPSTV8.0	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	01/08/2023	0800890/23-0	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	01/08/2023	0800890/23-0	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	01/08/2023	VP: 8 VPS: 1, 3, 8 e 9	VPTV9.0/VPSTV9.0	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	22/01/2024	0078495/24-5	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	06/04/2023	0345724/23-2	11315 - Alteração de texto de bula por avaliação de dados clínicos - GESEF	03/01/2024	VP: 4 VPS: 6	VPTV10.0/VPSTV10.0	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	21/05/2024	0673438/24-4	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	21/05/2024	0673438/24-4	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	21/05/2024	VP: 8 VPS: 9	VP TV 11.0 VPS TV 11.0	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	07/06/2024	0765675/24-2	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	18/04/2022	2447831/22-6	1315 - Alteração de texto de bula por avaliação de dados clínicos – GESEF	9/5/24	VPS: 3, 4, 5, 6 e Dizeres Legais VP: 4, 6 e Dizeres Legais	VP TV 12.0 VPS TV 12.0	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	07/06/2024	0765675/24-2	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	23/06/2024	0641353/23-5	1315 - Alteração de texto de bula por avaliação de dados clínicos – GESEF	10/5/24	VPS: 3, 5 VP: -	VP TV 12.0 VPS TV 12.0	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15 100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	23/10/2025	1411567/25-1	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	3/21/2025 10/16/2025	0385455/25-9 1386899/25-3	1444 - MEDICAMENTO NOVO - Cancelamento de Registro da Apresentação do Medicamento 11005 - RDC 73/2016 - NOVO - Alteração de razão social do local de fabricação do medicamento	3/31/2025 10/16/2025	VPS: Apresentações, 5 e Dizeres Legais VP: Apresentações, 4 e Dizeres Legais	VP TV 13.0 VPS TV 13.0	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	
Sporanox (itraconazol)	15/01/2026	0044605/26-9	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	15/01/2026	0044605/26-9	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	15/01/2026	VPS: 6 VP: 4	VP TV 14.0 VPS TV 14.0	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	

Sporanox (itraconazol)	08/05/2026	0448172/26-7	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	22/05/2024	0681680/24-5	1315 - Alteração de texto de bula por avaliação de dados clínicos – GESEF	15/04/2026	VPS: 1, 5, 6, 8 VP: 4, 6, 7	VP TV 15.0 VPS TV 15.0	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28
Sporanox (itraconazol)	08/09/2026	xxxxxxxx/xx-x	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	08/09/2026	xxxxxxxx/xx-x	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	08/09/2026	VPS: 6 VP: 4	VP TV 16.0 VPS TV 16.0	100 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28