

Abrysvo[®]

vacina vírus sincicial respiratório A e B (recombinante)

Pfizer Brasil Ltda.

Pó liofilizado

120 mcg



Abrysvo[®]
vacina vírus sincicial respiratório A e B (recombinante)

I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: Abrysvo[®]

Nome genérico: vacina vírus sincicial respiratório A e B (recombinante)

APRESENTAÇÃO

Abrysvo[®] pó liofilizado para solução injetável com diluente contém 120 mcg de vacina vírus sincicial respiratório A e B (recombinante), dose única de 0,5 mL após reconstituição, em embalagem com 1 frasco-ampola, 1 seringa preenchida com diluente, 1 adaptador e 1 agulha.

Abrysvo[®] pó liofilizado para reconstituição com diluente contém 120 mcg de vacina do vírus sincicial respiratório bivalente (recombinante), dose única de 0,5 mL após reconstituição, em embalagem com 10 frascos-ampola e 10 frascos-ampola com diluente.

VIA INTRAMUSCULAR

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada frasco-ampola de Abrysvo[®] 120 mcg, dose única (0,5 mL) contém:

Glicoproteína F do vírus sincicial respiratório (VSR) do subgrupo A estabilizada na conformação pré-fusão¹.....60 mcg

Glicoproteína F do vírus sincicial respiratório (VSR) do subgrupo B estabilizada na conformação pré-fusão¹.....60 mcg

Excipientes*.....q.s.p.

¹ Produzida em células do ovário de hamster chinês por tecnologia de DNA recombinante.

*Excipientes: trometamol, cloridrato de trometamol, sacarose, manitol, polissorbato 80, cloreto de sódio.

Diluente: água para injeção.



II - INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1. INDICAÇÕES

Abrysvo® é uma vacina indicada para:

- Prevenção da doença do trato respiratório inferior e da doença grave do trato respiratório inferior causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR) em crianças desde o nascimento até os 6 meses de idade por imunização ativa em gestantes.
- Prevenção da doença do trato respiratório inferior causada pelo VSR em indivíduos com 60 anos de idade ou mais por imunização ativa.
- Prevenção, por meio de imunização ativa, de doenças do trato respiratório inferior causadas pelo VSR em indivíduos de 18 a 59 anos, desde que apresentem alto risco de desenvolver doença grave.

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA

Eficácia clínica

Crianças do nascimento aos 6 meses de idade por imunização ativa em gestantes

O Estudo 1 (C3671008) foi um estudo de Fase 3, multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo para avaliar a eficácia, a segurança e a imunogenicidade de Abrysvo® na prevenção da doença do trato respiratório inferior com atendimento médico associada ao VSR em crianças nascidas de mulheres saudáveis vacinadas durante a gravidez e a segurança e a imunogenicidade em gestantes. Este foi um estudo global, incluindo locais de estudo em ambos os hemisférios Norte e Sul, e abrangeu várias temporadas do VSR. As participantes gestantes receberam uma dose única de Abrysvo® ou placebo (proporção de 1:1) no segundo ou terceiro trimestre de gestação. A dose do antígeno F de pré-fusão do VSR na Abrysvo® foi de 120 mcg (60 mcg A e 60 mcg B). A necessidade de revacinação em gestações subsequentes não foi estabelecida.

A doença do trato respiratório inferior associada ao VSR foi definida como uma visita com atendimento médico por infecção por VSR confirmada por reação em cadeia da polimerase por transcriptase reversa (RT-PCR) com um ou mais dos seguintes sintomas respiratórios: respiração rápida, baixa saturação de oxigênio ($SpO_2 < 95\%$) e tiragem intercostal. A doença grave do trato respiratório inferior associada ao VSR foi um subconjunto definido como o atendimento aos critérios de doença do trato respiratório inferior por VSR mais, pelo menos, uma das seguintes condições: respiração muito rápida, baixa saturação de oxigênio ($SpO_2 < 93\%$), cânula nasal de alto fluxo ou ventilação mecânica, internação na UTI por >4 horas e/ou falha de resposta/inconsciente.

O estudo incluiu mulheres saudáveis com ≤ 49 anos de idade que estavam entre 24 e 36 semanas de gestação, com gestações únicas, não complicadas. No estudo, 3.711 participantes gestantes foram randomizadas para o grupo de Abrysvo® e 3.709 para o grupo do placebo. As participantes gestantes consideradas de alto risco foram excluídas do estudo (IMC > 40 kg/m² antes da gravidez, gestações resultantes de fertilização *in vitro*, pré-eclâmpsia, eclâmpsia ou hipertensão gestacional descontrolada, anormalidades placentárias, polidrâmnios ou oligo-hidrâmnios, sangramento significativo ou transtorno de coagulação sanguínea, transtornos endócrinos instáveis, incluindo hipertireoidismo não tratado, hipotireoidismo não tratado ou transtornos não tratados de intolerância à glicose).

O objetivo do estudo foi avaliar a eficácia da vacina (EV), definida como a redução do risco relativo do desfecho de prevenção da infecção do trato respiratório inferior pelo VSR em bebês no grupo de Abrysvo® em comparação com o grupo do placebo, em crianças participantes nascidas de gestantes que receberam 1 dose de Abrysvo®. Na análise primária, houve dois desfechos primários de eficácia avaliados em paralelo: doença grave do trato respiratório inferior por VSR com atendimento médico e doença do trato respiratório inferior por VSR com atendimento médico, ocorrendo dentro de 90/120/150/180 dias após o nascimento. Outros desfechos de eficácia incluíram doença do trato respiratório inferior com atendimento médico devido ao VSR em bebês até 360 dias após o nascimento, hospitalização devido ao VSR até 360 dias após o nascimento e doença do trato respiratório com atendimento médico devido ao VSR em bebês, ocorrendo dentro de 90/120/150/180 dias após o nascimento.

As características demográficas no Estudo 1 foram geralmente semelhantes em relação à idade, raça e etnia entre os participantes que receberam Abrysvo® e aqueles que receberam placebo. Dos participantes que receberam Abrysvo®, 65% eram brancos, 20% eram negros ou afro-americanos e 29% eram hispânicos/latinos. A mediana da idade dos participantes foi de 29 anos (variação de 16 a 45 anos). A mediana da idade gestacional na



vacinação foi de 31 semanas e 2 dias. A mediana da idade gestacional dos bebês ao nascer foi de 39 semanas e 1 dia (variação de 27 semanas e 3 dias a 43 semanas e 6 dias). Entre os bebês nascidos de mães participantes, 51% eram do sexo masculino e 49% do sexo feminino.

Os resultados da EV atenderam ao critério estatístico para sucesso (limite inferior do Intervalo de Confiança (IC) >20%) na redução de doença grave do trato respiratório inferior com atendimento médico devido ao VSR, em todos os pontos de tempo ao longo de 180 dias. Os resultados da EV não atenderam ao critério estatístico para sucesso (limite inferior do IC >20%) na redução de doença do trato respiratório inferior com atendimento médico devido ao VSR; no entanto, eficácia clinicamente significativa foi observada de 90 dias até 180 dias após o nascimento.

Os resultados da EV atenderam ao critério estatístico para sucesso (limite inferior do IC >0%) para doença do trato respiratório inferior por VSR com atendimento médico em bebês, em todos os pontos de tempo dentro de 210 a 360 dias após o nascimento e para hospitalização devido ao VSR em bebês em todos os pontos de tempo durante 180 dias; o critério estatístico para sucesso não foi atendido para hospitalização em 360 dias. A EV foi observada para doença do trato respiratório por VSR com atendimento médico, em todos os pontos de tempo até 180 dias após o nascimento.

As informações sobre a eficácia da vacina são apresentadas nas Tabelas 1 a 5.

Tabela 1. Eficácia da vacina Abrysvo® contra doença grave do trato respiratório inferior com atendimento médico causada pelo VSR - bebês desde o nascimento até 6 meses de idade por imunização ativa em gestantes (Estudo 1)

Período de tempo	Abrysvo® Número de casos N = 3495	Placebo Número de casos N = 3480	% de EV (IC) ^a
90 dias	6	33	81,8 (40,6; 96,3)
120 dias	12	46	73,9 (45,6; 88,8)
150 dias	16	55	70,9 (44,5; 85,9)
180 dias	19	62	69,4 (44,3; 84,1)

IC = intervalo de confiança; EV = eficácia da vacina

^a IC de 99,5% em 90 dias; IC de 97,58% em intervalos posteriores

Tabela 2. Eficácia da vacina Abrysvo® contra doença do trato respiratório inferior com atendimento médico causada pelo VSR - bebês desde o nascimento até 6 meses de idade por imunização ativa em gestantes (Estudo 1)

Período de tempo	Abrysvo® Número de casos N = 3495	Placebo Número de casos N = 3480	% de EV (IC) ^a
90 dias	24	56	57,1 (14,7; 79,8)
120 dias	35	81	56,8 (31,2; 73,5)
150 dias	47	99	52,5 (28,7; 68,9)
180 dias	57	117	51,3 (29,4; 66,8)

IC = intervalo de confiança; EV = eficácia da vacina

^a IC de 99,5% em 90 dias; IC de 97,58% em intervalos posteriores

Foi realizada uma análise *post-hoc* da EV por idade gestacional materna. Para casos graves de doença do trato respiratório inferior com atendimento médico ocorrendo em 180 dias, a EV foi de 57,2% (IC 95% 10,4; 80,9) para mulheres vacinadas no início da gravidez (24 a <30 semanas) e 78,1% (IC 95% 52,1; 91,2) para mulheres vacinadas mais tarde na janela elegível para gravidez (30 a 36 semanas). Para doença do trato respiratório inferior com atendimento médico ocorrendo dentro de 180 dias, a EV foi de 30,9% (IC 95% -14,4; 58,9) para mulheres vacinadas no início da gravidez (24 a <30 semanas) e 62,4% (IC 95% 41,6; 76,4) para mulheres vacinadas mais tarde na janela elegível para gravidez (30 a 36 semanas).

Tabela 3. Eficácia da vacina Abrysvo® contra doença do trato respiratório inferior com atendimento médico causada pelo VSR - bebês desde o nascimento até 12 meses de idade por imunização ativa em gestantes (Estudo 1)

Período de tempo	Abrysvo® Número de casos N = 3495	Placebo Número de casos N = 3480	% de EV (IC) ^a
210 dias	70	127	44,9 (17,9; 63,5)
240 dias	76	133	42,9 (16,1; 61,6)
270 dias	82	137	40,1 (13,0; 59,2)
360 dias	92	156	41,0 (16,2; 58,9)

IC = intervalo de confiança; EV = eficácia da vacina

^a IC de 99,17%

Tabela 4. Eficácia da vacina Abrysvo® contra hospitalização devido ao VSR - bebês desde o nascimento até 12 meses de idade por imunização ativa em gestantes (Estudo 1)

Período de tempo	Abrysvo® Número de casos N = 3495	Placebo Número de casos N = 3480	% de EV (IC) ^a
90 dias	10	31	67,7 (15,9; 89,5)
120 dias	15	37	59,5 (8,3; 83,7)
150 dias	17	39	56,4 (5,2; 81,5)
180 dias	19	44	56,8 (10,1; 80,7)
360 dias	38	57	33,3 (-17,6; 62,9)

IC = intervalo de confiança; EV = eficácia da vacina

^a IC de 99,17%

Tabela 5. Eficácia da vacina Abrysvo® contra doença do trato respiratório com atendimento médico causada pelo VSR - bebês desde o nascimento até 6 meses de idade por imunização ativa em gestantes (Estudo 1)

Período de tempo	Abrysvo® Número de casos N = 3495	Placebo Número de casos N = 3480	% de EV (IC) ^a
90 dias	67	110	39,1 (16,7; 55,7)
120 dias	98	160	38,7 (20,8; 52,9)
150 dias	126	209	39,7 (24,4; 52,1)
180 dias	157	253	37,9 (24,0; 49,5)

IC = intervalo de confiança; EV = eficácia da vacina

^a IC de 95%

Indivíduos com 18 anos ou mais por imunização ativa

Indivíduos com 60 anos de idade ou mais

O Estudo 2 (C3671013) foi um estudo de fase 3, multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo para avaliar a eficácia, imunogenicidade e segurança de Abrysvo® na prevenção da doença do trato respiratório inferior associada ao VSR em indivíduos com 60 anos de idade ou mais durante a primeira temporada de VSR e a eficácia de longo prazo e imunogenicidade de Abrysvo® em duas temporadas do VSR. A necessidade de revacinação com uma dose subsequente de Abrysvo® não foi estabelecida.

A doença aguda do trato respiratório associada ao VSR foi definida como doença associada ao VSR confirmada por RT-PCR com um ou mais dos seguintes sintomas respiratórios dentro de 7 dias após o início dos sintomas e com duração de mais de 1 dia durante a mesma doença: dor de garganta nova ou aumentada, congestão nasal, coriza nasal, tosse, sibilos, produção de escarro ou falta de ar.

A doença do trato respiratório inferior associada ao VSR foi definida como doença associada ao VSR confirmada por RT-PCR com dois ou mais, ou três ou mais, dos seguintes sintomas respiratórios dentro de 7 dias após o início dos sintomas e com duração de mais de 1 dia durante o mesmo episódio: tosse nova ou aumentada, sibilos, produção de escarro, falta de ar ou taquipneia (≥ 25 respirações/minuto ou aumento de 15% em relação ao valor basal de repouso). A doença grave do trato respiratório inferior associada ao VSR foi definida como o



cumprimento dos critérios de doença do trato respiratório inferior associada ao VSR mais, pelo menos, uma das seguintes condições: hospitalização devido à doença do trato respiratório inferior associada ao VSR, suplementação de oxigênio ou ventilação mecânica nova ou aumentada, incluindo pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP).

O nível de dose do antígeno F de pré-fusão do VSR na Abrysvo® para este estudo foi de 120 microgramas (60 mcg A e 60 mcg B). Os participantes foram randomizados (1:1) para receber Abrysvo® (n=18.487) ou placebo (n=18.479). Os indivíduos foram estratificados por idade, 60-69 anos (63%), 70-79 anos (32%) e ≥80 anos (6%). Foram incluídos adultos saudáveis e adultos com doenças crônicas estáveis. Os participantes (16%) apresentavam condições cardiopulmonares crônicas estáveis, como doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma ou insuficiência cardíaca congestiva (ICC).

O objetivo primário foi avaliar a eficácia da vacina (EV), definida como a redução do risco relativo do primeiro episódio de doença do trato respiratório inferior associada ao VSR no grupo de Abrysvo® em comparação com o grupo de placebo na primeira temporada do VSR. Os objetivos secundários foram a avaliação da EV, definida como a redução do risco relativo do primeiro episódio da doença grave do trato respiratório inferior associada ao VSR e da doença respiratória aguda no grupo de Abrysvo® em comparação com o grupo de placebo na primeira temporada do VSR. Outros desfechos de eficácia incluem a eficácia de Abrysvo® na prevenção da doença do trato respiratório inferior associada ao VSR e da doença respiratória aguda em duas temporadas do VSR após a vacinação.

As características demográficas no Estudo 2 foram geralmente semelhantes em relação à idade, sexo, raça e etnia entre os participantes que receberam Abrysvo® e aqueles que receberam placebo. Dos participantes que receberam Abrysvo®, 51% eram do sexo masculino e 80% eram brancos, 12% eram negros ou afro-americanos e 42% eram hispânicos/latinos. A mediana da idade dos participantes foi de 67 anos (variação de 59 a 95 anos).

O estudo cumpriu os objetivos primários de redução dos casos de doenças do trato respiratório inferior por VSR com ≥2 sintomas e dos casos de doenças do trato respiratório inferior por VSR com ≥3 sintomas.

As informações sobre a eficácia da vacina no final da primeira e segunda temporadas do VSR e combinadas nas duas temporadas de VSR, são apresentadas na Tabela 6. A eficácia da vacina é mantida durante duas temporadas de VSR.

Tabela 6. Eficácia da vacina Abrysvo® contra a doença por VSR - imunização ativa de indivíduos com 60 anos ou mais (Estudo 2)

Desfecho de eficácia	Abrysvo® Número de casos	Placebo Número de casos	% de EV (IC 95%)
Primeira temporada VSR	N=18.058	N=18.076	
Primeiro episódio de doença respiratória aguda associada ao VSR ^a	37	98	62,2 (44,4; 74,9)
Primeiro episódio de doença do trato respiratório inferior associada ao VSR com ≥ 2 sintomas ^b	15	43	65,1 (35,9; 82,0)
Primeiro episódio de doença do trato respiratório inferior associada ao VSR com ≥ 3 sintomas ^c	2	18	88,9 (53,6; 98,7)
Segunda temporada VSR^a	N=16.164	N=16.059	
Primeiro episódio de doença respiratória aguda associada ao VSR	149	236	36,9 (22,2, 48,9)
Primeiro episódio de doença do trato respiratório inferior associada ao VSR com ≥ 2 sintomas	39	88	55,7 (34,7, 70,4)
Primeiro episódio de doença do trato respiratório inferior associada ao VSR com ≥ 3 sintomas	8	36	77,8 (51,4, 91,1)
Em 2 temporadas VSR^{a, b}	N=18.050	N=18.074	
Primeiro episódio de doença respiratória aguda associada ao VSR	186	334	44,3 (33,2, 53,7)
Primeiro episódio de doença do trato respiratório inferior associada ao VSR com ≥ 2 sintomas	54	131	58,8 (43,0, 70,6)
Primeiro episódio de doença do trato respiratório inferior associada ao VSR com ≥ 3 sintomas	10	54	81,5 (63,3, 91,6)

IC – intervalo de confiança; VSR – vírus sincicial respiratório; EV – eficácia da vacina

^a Análise exploratória

^b Temporadas VSR 1 e 2 combinadas

No fim da segunda temporada do VSR, as análises dos subgrupos de EV por idade, condições subjacentes significativas pré-especificadas e subgrupos de VSR A e VSR B em receptores de Abrysvo® foram consistentes com as principais análises e apoiam uma EV consistente em diferentes grupos etários e de risco.

Tabela 7. Análise da eficácia da vacina Abrysvo® contra a doença por VSR por subgrupo - imunização ativa de indivíduos com 60 anos ou mais (Estudo 2)

Desfecho de eficácia	Subgrupo	Abrysvo® Número de casos	Placebo Número de casos	EV (%) (IC 95%)
Primeira temporada VSR				
Primeiro episódio de doença respiratória aguda associada ao VSR	Idade 60-69 anos	25/11.305	68/11.351	63,2 (41,1, 77,7)
	Idade 70-79 anos	9/5.750	22/5.742	59,1 (7,6, 83,4)
	Idade ≥80 anos	3/995	8/981	62,5 (-56,2, 93,6)
	Com ≥1 condição subjacente significativa	16/9.387	47/9.448	66,0 (38,9, 82,0)
	VSR subgrupo A	11/18.050	35/18.074	68,6 (36,8, 85,6)
	VSR subgrupo B	26/18.050	63/18.074	58,7 (33,9, 74,9)
Primeiro episódio de doença do trato respiratório inferior associada ao VSR com ≥2 sintomas	Idade 60-69 anos	10/11.305	25/11.351	60,0 (13,8, 82,9)
	Idade 70-79 anos	4/5.750	12/5.742	66,7 (-10,0, 92,2)
	Idade ≥80 anos	1/995	6/981	83,3 (-37,4, 99,6)
	Com ≥1 condição subjacente significativa	8/9.377	22/9.432	63,6 (15,2, 86,0)
	VSR subgrupo A	3/18.050	16/18.074	81,3 (34,5, 96,5)
	VSR subgrupo B	12/18.050	26/18.074	53,8 (5,2, 78,8)
Primeiro episódio de doença do trato respiratório inferior associada ao VSR com ≥3 sintomas	Idade 60-69 anos	2/11.305	11/11.351	81,8 (16,7, 98,0)
	Idade 70-79 anos	0/5.750	4/5.742	100 (-51,5, 100,0)
	Idade ≥80 anos	0/995	3/981	100 (-142,0, 100,0)
	Com ≥1 condição subjacente significativa	2/9.377	11/9.432	81,8 (16,7, 98,0)
	VSR subgrupo A	1/18.050	5/18.074	80,0 (-78,7, 99,6)
	VSR subgrupo B	1/18.050	12/18.074	91,7 (43,7, 99,8)
Segunda temporada VSR				
Primeiro episódio de doença respiratória aguda associada ao VSR	Idade 60-69 anos	101/10.222	161/10.196	37,3 (19,0, 51,6)
	Idade 70-79 anos	41/5.111	67/5.056	38,8 (8,4, 59,6)
	Idade ≥80 anos	7/831	8/807	12,5 (-176,1, 73,0)
	Com ≥1 condição subjacente significativa	74/8.415	122/8.399	39,3 (18,4, 55,2)
	VSR subgrupo A	106/16.164	175/16.059	39,4 (22,5, 52,9)
	VSR subgrupo B	43/16.164	64/16.059	32,8 (-0,4, 55,4)
Primeiro episódio de doença do trato respiratório inferior associada ao VSR com ≥2 sintomas	Idade 60-69 anos	24/10.222	55/10.196	56,4 (28,3, 74,2)
	Idade 70-79 anos	11/5.111	28/5.056	60,7 (18,6, 82,4)
	Idade ≥80 anos	4/831	5/807	20,0 (-271,7, 84,1)
	Com ≥1 condição subjacente significativa	28/8.415	49/8.399	42,9 (7,3, 65,4)
	VSR subgrupo A	24/16.164	64/16.059	62,5 (39,2, 77,6)
	VSR subgrupo B	14/16.164	26/16.059	46,2 (-7,0, 74,0)
Primeiro episódio de doença do trato respiratório inferior associada ao VSR com ≥3 sintomas	Idade 60-69 anos	5/10.222	27/10.196	81,5 (51,2, 94,4)
	Idade 70-79 anos	3/5.111	7/5.056	57,1 (-87,7, 92,8)
	Idade ≥80 anos	0/831	2/807	100,0 (-432,5, 100,0)
	Com ≥1 condição subjacente significativa	7/8.415	23/8.399	69,6 (26,7, 89,0)
	VSR subgrupo A	5/16.164	26/16.059	80,8 (49,1, 94,2)
	VSR subgrupo B	2/16.164	10/16.059	80,0 (6,1, 97,9)
Em 2 temporadas de VSR^b				
Primeiro episódio de doença respiratória aguda associada	Idade 60-69 anos	126/11.305	229/11.351	45,0 (31,3, 56,1)
	Idade 70-79 anos	50/5.750	89/5.742	43,8 (19,7, 61,1)
	Idade ≥80 anos	10/995	16/981	37,5 (-46,5, 74,6)
	Com ≥1 condição subjacente significativa	90/9.387	169/9.448	46,7 (30,8, 59,2)

Desfecho de eficácia	Subgrupo	Abrysvo® Número de casos	Placebo Número de casos	EV (%) (IC 95%)
ao VSR	VSR subgrupo A	117/18.050	210	44,3 (29,8, 55,9)
	VSR subgrupo B	69	127	45,7 (26,6, 60,1)
Primeiro episódio de doença do trato respiratório inferior associada ao VSR com ≥2 sintomas	Idade 60-69 anos	34/11.305	80/11.351	57,5 (35,8, 72,4)
	Idade 70-79 anos	15/5.750	40/5.742	62,5 (30,6, 80,8)
	Idade ≥80 anos	5/995	11/981	54,5 (-41,9, 87,6)
	Com ≥1 condição subjacente significativa	36/9.387	71/9.448	49,3 (23,2, 67,0)
	VSR subgrupo A	27/18.050	80/18.074	66,3 (47,2, 79,0)
	VSR subgrupo B	26/18.050	52/18.074	50,0 (18,5, 70,0)
Primeiro episódio de doença do trato respiratório inferior associada ao VSR com ≥3 sintomas	Idade 60-69 anos	7/11.305	38/11.351	81,6 (58,2, 93,1)
	Idade 70-79 anos	3/5.750	11/5.742	72,7 (-3,2, 95,1)
	Idade ≥80 anos	0/995	5/981	100,0 (-9,1, 100,0)
	Com ≥1 condição subjacente significativa	9/9.387	34/9.448	73,5 (43,6, 88,8)
	VSR subgrupo A	6/18.050	31/18.074	80,6 (52,9, 93,4)
	VSR subgrupo B	3/18.050	22/18.074	86,4 (54,6, 97,4)

CI – intervalo de confiança; VSR – vírus sincicial respiratório; EV – eficácia da vacina

^a Análise exploratória

^b Temporadas 1 e 2 do VSR combinadas

Indivíduos de 18 a 59 anos de idade

A não inferioridade dos objetivos primários de imunogenicidade foi alcançada, demonstrando a eficácia de Abrysvo® no grupo de alto risco de 18 a 59 anos de idade. A imunogenicidade foi semelhante naqueles de alto risco e em participantes saudáveis em outros estudos clínicos semelhantes.

O Estudo 3 (C3671023 Subestudo A) foi um estudo de Fase 3, multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo para avaliar a segurança e imunogenicidade de Abrysvo® em indivíduos de 18 a 59 anos de idade considerados de alto risco de desenvolver doença grave do trato respiratório inferior causada por VSR. O Estudo 3 incluiu indivíduos com doenças pulmonares crônicas (incluindo asma), cardiovasculares (excluindo hipertensão isolada), renais, hepáticas, neurológicas, hematológicas ou metabólicas (incluindo diabetes *mellitus* e hiper/hipotireoidismo). Os participantes foram randomizados (2:1) para receber uma dose única de Abrysvo® (n=437) ou placebo (n=217).

As características demográficas no Estudo 3 foram geralmente semelhantes em relação à idade, raça e etnia entre os participantes que receberam Abrysvo® e aqueles que receberam o placebo; 43% e 32% dos participantes nos grupos de Abrysvo® e do placebo, respectivamente, eram do sexo masculino. Dos participantes que receberam Abrysvo®, 69% eram brancos, 23% eram negros ou afro-americanos e 23% eram hispânicos/latinos. Cinquenta e três por cento (53%) tinham entre 18 e 49 anos e 47% tinham entre 50 e 59 anos. A mediana da idade dos participantes foi de 49 anos. Os grupos da vacina e do placebo também foram semelhantes em relação à presença de pelo menos uma condição médica pré-especificada, incluindo 53% com ≥1 doença pulmonar crônica, 8% com ≥1 doença cardiovascular, 42% com diabetes e 31% com ≥1 outra doença (hepática, renal, neurológica, hematológica ou outra doença metabólica).

Os critérios de não inferioridade foram atendidos para indivíduos de alto risco de 18 a 59 anos de idade em comparação com indivíduos ≥60 anos de idade para a proporção de títulos médios geométricos (GMTs) neutralizantes de VSR pelos limites inferiores dos ICs bilaterais de 95% >0,667 (1,5 vezes a margem de não inferioridade) e para a diferença nas taxas de resposta sorológica pelos limites inferiores dos ICs bilaterais de 95% >-10% para VSR A e VSR B.

Tabela 8. Comparação de GMTs de títulos neutralizantes de VSR ajustados ao modelo 1 mês após a vacinação com Abrysvo®, 18 a 59 anos de idade de alto risco (Estudo 3) versus 60 anos ou mais (Estudo 2)

(Estudo 2)					
	Grupo populacional e GMT ajustados pela ANCOVA				
	Estudo 3 18-59 anos de idade em alto risco		Estudo 2 ≥60 anos		Comparação ANCOVA
Subgrupos VSR	n	GMT ajustado (IC de 95%)	n	GMT ajustado (IC de 95%)	GMR ajustado (IC de 95%)
A	435	41097 (37986; 44463)	408	26225 (24143; 28486)	1,57 (1,396; 1,759)
B	437	37416 (34278; 40842)	408	24680 (22504; 27065)	1,52 (1,333; 1,725)

ANCOVA – análise de covariância; IC – intervalo de confiança; GMR – razão média geométrica; GMT – título médio geométrico

Tabela 9. Comparação de GMTs das taxas de resposta sorológica de títulos neutralizantes de VSR 1 mês após a vacinação com Abrysvo®, 18 a 59 anos de idade de alto risco (Estudo 3) versus 60 anos ou mais (Estudo 2)

ou mais (Estudo 2)					
	Grupo populacional				
	Estudo 3 18-59 anos de idade em alto risco		Estudo 2 ≥60 anos		Comparação
Subgrupos de VSR	n/N (%)	IC de 95%	n/N (%)	IC de 95%	Diferença (IC de 95%)
A	405/435 (93)	90,3; 95,3	359/408 (88)	84,4; 91,0	5,1 (1,2; 9,2)
B	408/437 (93)	90,6; 95,5	347/408 (85)	81,2; 88,4	8,3 (4,2; 12,6)

IC – Intervalo de confiança; GMT – título médio geométrico

Os seguintes critérios de elegibilidade foram estabelecidos para selecionar indivíduos para os quais a participação no estudo foi considerada apropriada.

Critérios de inclusão:

Os participantes eram elegíveis para serem incluídos no estudo somente se todos os critérios de inclusão estivessem de acordo com o preconizado:

Idade e sexo

1. Participantes ≥18 a <60 anos de idade na randomização do estudo.

Tipo de participante e características da doença:

2. Expectativa de vida ≥12 meses (365 dias) na opinião do pesquisador no momento da randomização.
3. Participantes que estivessem dispostos e fossem capazes de cumprir todas as visitas programadas, plano de vacinação, considerações de estilo de vida e outros procedimentos do estudo.
4. Participantes considerados de alto risco de doença por VSR em virtude do seguinte:
 - Adultos com distúrbios pulmonares crônicos (incluindo asma), cardiovasculares (excluindo hipertensão isolada), renais, hepáticos, neurológicos, hematológicos ou metabólicos (incluindo diabetes mellitus).

Condições médicas crônicas para este subestudo são definidas como:

- Duração maior que 6 meses.
- Doença estável que não requer uma mudança significativa na terapia nas 6 semanas anteriores ou hospitalização por agravamento da doença dentro de 12 semanas antes do recebimento da intervenção do estudo.
- Requer acompanhamento médico regular ou medicação contínua ou hospitalização no ano anterior.

Grupos adicionais de alto risco incluem:

- Residentes de casas de repouso e outras instalações de cuidados de longa permanência.

Critérios de exclusão:

Os participantes foram excluídos do estudo se algum dos seguintes critérios se aplicasse:

Condições médicas:



1. Diátese hemorrágica ou condição associada a sangramento prolongado que, na opinião do investigador, contraindicaria a injeção intramuscular.
2. Histórico de reação adversa grave associada a uma vacina e/ou reação alérgica grave (por exemplo, anafilaxia) a qualquer componente da(s) intervenção(ões) do estudo ou qualquer vacina relacionada.
3. Participantes que não tivessem massa muscular deltoide adequada para permitir a vacinação intramuscular, na opinião do investigador.
4. Distúrbio crônico grave, incluindo malignidade metastática, doença renal em estágio terminal com ou sem diálise, doença cardíaca clinicamente instável ou qualquer outro distúrbio que, na opinião do investigador, excluísse o participante da inclusão no estudo.
5. Pacientes imunocomprometidos com imunodeficiência conhecida ou suspeita, conforme determinado pelo histórico e/ou exame laboratorial/físico.
6. Outra condição médica ou psiquiátrica, incluindo ideação/comportamento suicida recente (no último ano) ou ativo ou anormalidade laboratorial que pudesse aumentar o risco de participação no estudo ou, no julgamento do investigador, tornar o participante inapropriado para o estudo.

Terapia prévia/concomitante:

7. Pacientes que recebessem tratamento sistêmico crônico com terapia imunossupressora, incluindo agentes citotóxicos, anticorpos monoclonais imunossupressores, corticosteroides sistêmicos ou radioterapia, por exemplo, para câncer ou doença autoimune, 60 dias antes da administração da intervenção do estudo ou com recebimento planejado durante todo o estudo.

Observação: Corticosteroides sistêmicos são definidos como aqueles administrados por ≥ 14 dias em uma dose de ≥ 20 mg/dia de prednisona ou equivalente (por exemplo, para câncer ou doença autoimune) ou recebimento planejado durante todo o estudo. Corticosteroides sistêmicos administrados em uma dose de < 20 mg/dia de prednisona ou equivalente eram permitidos. Corticosteroides inalatórios/nebulizados, intra-articulares, intrabursais ou tópicos (pele, olhos ou ouvidos) eram permitidos.

8. Recebimento de produtos sanguíneos/plasmáticos ou imunoglobulina dentro de 60 dias antes da administração da intervenção do estudo ou com recebimento planejado desses medicamentos antes da coleta de sangue final.

Observação: Anticorpos monoclonais com mecanismos de ação direcionados usados no tratamento de doenças crônicas (por exemplo, enxaquecas, osteoporose) eram permitidos, desde que não atendessem ao critério de exclusão 7.

9. Vacinação prévia com qualquer vacina VSR licenciada ou experimental ou com recebimento planejado durante a participação no estudo.

Experiência prévia/simultânea em estudo clínico:

10. Participação em outros estudos envolvendo um produto investigacional dentro de 28 dias antes do consentimento e/ou durante e incluindo a visita de acompanhamento de 6 meses.

Observação: Este critério não se aplicava a indivíduos que estivessem participando de um período de acompanhamento para outro estudo envolvendo uma intervenção de estudo que fosse um medicamento ou vacina investigacional, se o recebimento da última dose foi pelo menos 6 meses antes do consentimento para este estudo e não houvesse nenhuma dosagem adicional prevista do estudo anterior durante a participação do indivíduo neste estudo.

Outros critérios de exclusão:

11. Equipe local do investigador diretamente envolvida na condução do estudo e seus familiares, equipe local supervisionada de outra forma pelo investigador, funcionários do patrocinador e delegado do patrocinador diretamente envolvidos na condução do estudo e seus familiares.

Imunogenicidade em indivíduos com 60 anos de idade ou mais no Estudo 2

Primeira temporada VSR

Uma dose única de Abrysvo[®] produziu respostas neutralizantes fortes contra VSR A e VSR B em 1 mês após a vacinação. No grupo Abrysvo[®] (n= 534), os aumentos da média geométrica (GMFRs) de títulos neutralizantes (NTs) para VSR A, VSR B e VSR A/B combinados foram de 11,6, 12,7 e 12,1, respectivamente.



As análises de subgrupos por idade e grupos de alto risco pré-especificados em recebedores de Abrysvo[®] foram consistentes com as principais análises e corroboram a eficácia consistente da vacina observada em diferentes grupos etários e de risco. Os GMFRs de títulos neutralizantes para VSR A, VSR B e VSR A/B combinados foram de 11,4, 12,6 e 12,0, respectivamente, no grupo etário de 60 a 69 anos, 12,1, 12,8 e 12,4 no grupo etário de 70 a 79 anos e 11,2, 15,2 e 13,0 no grupo etário com ≥ 80 anos. Os GMFRs de NTs para VSR A, VSR B e VSR A/B combinados foram 12,3, 13,8 e 13,0, respectivamente, nos recebedores com >1 condição subjacente significativa.

Imunogenicidade em indivíduos imunocomprometidos com 18 anos de idade ou mais

O Estudo 4 (C3671023 Subestudo B) foi um estudo de Fase 3, de braço único, aberto e multicêntrico para avaliar a segurança e imunogenicidade de Abrysvo[®] em indivíduos imunocomprometidos com ≥ 18 anos de idade. Os participantes tinham histórico de transplante de órgão sólido (rim, fígado, pulmão ou coração) pelo menos 3 meses antes da randomização; doença renal em estágio terminal e em hemodiálise; distúrbios inflamatórios autoimunes com terapia imunomoduladora ativa; ou câncer de pulmão de células não pequenas avançado e recebendo terapia imunomoduladora ativa. Os participantes receberam 2 doses de Abrysvo[®] com um intervalo de 1 mês.

Uma dose única de Abrysvo[®] foi suficiente para provocar respostas neutralizantes robustas aproximadamente 8 ou 9 vezes acima da linha de base contra VSR A e VSR B em participantes ≥ 18 anos de idade com condições de imunocomprometimento (n=188). As respostas não aumentaram ainda mais com uma segunda dose de Abrysvo[®] 1 mês após a primeira dose.

Imunogenicidade em indivíduos com infecção por HIV

Imunogenicidade em gestantes com infecção por HIV e seus bebês

O Estudo 5 (C3671032) foi um estudo de Fase 3, multicêntrico, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, conduzido na África do Sul para avaliar a segurança e imunogenicidade de Abrysvo[®] em gestantes ≤ 49 anos de idade com infecção estável por HIV e seus bebês. As gestantes (n=343) foram randomizadas (1:1) para receber uma dose de Abrysvo[®] ou placebo.

As características demográficas e de base dos participantes foram semelhantes entre os grupos Abrysvo[®] e placebo e os grupos etários gestacionais. A maioria dos participantes maternos era negra ou afro-americana (99%) e não hispânica/não latina (86%). A idade materna mediana na vacinação era de 31 anos (faixa de 16-44 anos), a idade gestacional mediana na vacinação era de 29 semanas (faixa de 24-36 semanas). A maioria dos bebês (92%) nasceu a termo.

Abrysvo[®] provocou respostas neutralizadoras robustas em gestantes incluídas no estudo, com títulos de neutralização altos correspondentes alcançados em participantes bebês entre a maioria dos subgrupos.

Em gestantes incluídas no estudo, as razões médias geométricas (GMRs), estimadas pela razão entre os títulos médios geométricos (GMTs) do grupo Abrysvo[®] em comparação ao grupo placebo, para VSR A, VSR B e os títulos neutralizadores séricos (NTs) combinados de VSR A/B foram 7,9, 7,2 e 7,5, respectivamente. Abrysvo[®] provocou respostas imunes ligeiramente menores, mas no geral semelhantes, em gestantes incluídas no estudo com infecção por HIV em comparação com participantes maternas sem HIV do Estudo 1.

Os aumentos médios geométricos em relação ao valor basal (GMFRs) para o grupo Abrysvo[®], em comparação com as gestantes incluídas no estudo do grupo placebo para VSR A, VSR B e NTs séricos combinados de VSR A/B foram 8,0, 7,3 e 7,7, respectivamente. As taxas de sororesposta no parto em participantes maternas do grupo Abrysvo[®] foram de 76,4% para o VSR A, 73,6% para o VSR B e 78,5% para NTs séricos combinados do VSR A/B.

Em uma análise exploratória, para bebês participantes nascidos de mães que receberam Abrysvo[®], os GMRs de bebês nascidos de gestantes incluídas no estudo com HIV em comparação com bebês nascidos de gestantes sem HIV (Estudo 1), foram ligeiramente menores ao nascer para VSR A (0,86), VSR B (0,72) e os NTs séricos combinados VSR A/B (0,79).

Imunogenicidade em indivíduos com 60 anos de idade ou mais com infecção por HIV

O segundo estudo incluiu participantes com infecção estável por HIV (n=121, em terapia antirretroviral, com supressão viral e contagem recente de CD4 $>200/\mu\text{l}$), sendo que 62 desses participantes receberam Abrysvo[®].



Dos 121 participantes, 69% eram homens, 27% negros ou afro-americanos e 44% apresentavam $\geq$ 1-comorbidade de alto risco (em comparação com 52% dos participantes gerais do Estudo 2). A idade mediana era de 64 anos.

Em uma análise post-hoc, as respostas imunes em indivíduos com infecção estável por HIV foram comparadas com as de um grupo controle soronegativo selecionado aleatoriamente entre Estudo 2 participantes sem histórico médico de infecção por HIV (n=150). Abrysvo[®] provocou respostas imunes globalmente semelhantes em participantes adultos com infecção estável por HIV quando comparado a participantes sem HIV. Em indivíduos com infecção por HIV, os GMRs, estimados pela razão dos GMTs do grupo Abrysvo[®] em comparação ao grupo placebo, para VSR A, VSR B e NTs séricos combinados de VSR A/B foram 10,7, 9,7 e 10,2, respectivamente, para indivíduos com infecção por HIV, em comparação com 7,9, 9,8 e 8,8 para uma população controle HIV negativa do estudo.

Referências

1. C3671008. A Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of RSVpreF in Infants Born to Women Vaccinated During Pregnancy. Clinical Trials: NCT04424316.
2. C3671013. A Study to Assess the Safety, Tolerability, and Immunogenicity of RSVpreF in Adults at High Risk of Severe RSV Disease. Clinical Trials: NCT05842967.
3. Walsh EE, Pérez Marc G, Falsey AR, Jiang Q, Eiras D, Patton M, Polack FP, Llapur C, Doreski PA, Zareba AM, Ilangoan K, Rămet M, Fukushima Y, Hussien N, Bont LJ, Cardona J, DeHaan E, Mikati T, Shah RN, Schneider K, Cooper D, Koury K, Lino MM, Anderson AS, Jansen KU, Swanson KA, Gruber WC, Schmoele-Thoma B, Gurtman A. RENOIR Trial - RSVpreF Vaccine Efficacy over Two Seasons. N Engl J Med. 2024 Oct 17;391(15):1459-1460. doi: 10.1056/NEJMc2311560. PMID: 39413383.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

Propriedades Farmacodinâmicas

Mecanismo de ação

Abrysvo[®] é uma formulação bivalente contendo dois antígenos de glicoproteínas F recombinantes do VSR, estabilizados na conformação de pré-fusão, cada um representando os dois principais subgrupos de vírus: VSR A e VSR B. A proteína F do VSR pode existir em duas formas antígenicamente distintas: pré-fusão e pós-fusão. Diferente da pós-fusão F, a pré-fusão F é a forma ativa da proteína e é capaz de mediar a fusão de membranas celulares do vírus e do hospedeiro durante a entrada da célula. Portanto, a proteína F pré-fusão é o principal alvo dos anticorpos neutralizadores mais potentes que bloqueiam a infecção por VSR. Os anticorpos neutralizantes séricos mais elevados estão associados a um risco reduzido de doença. Após a administração intramuscular, os antígenos da vacina geram uma resposta imune, que protege contra a doença do trato respiratório inferior associada ao VSR.

Em gestantes, a ação dos anticorpos neutralizantes que conferem proteção é mediada por meio da transferência passiva desses anticorpos da mãe para o bebê. Adultos com 18 anos de idade ou mais estão protegidos pela imunização ativa.

Propriedades farmacocinéticas

Não aplicável.

Dados de segurança pré-clínicos

Dados não clínicos não revelaram qualquer risco especial para humanos com base nos estudos convencionais de toxicidade de dose repetida e toxicidade reprodutiva e do desenvolvimento.

Toxicidade reprodutiva e de desenvolvimento

Um único estudo foi conduzido para avaliar os efeitos potenciais de Abrysvo[®] sobre a fertilidade e o desenvolvimento embrionário/fetal em coelhas brancas fêmeas da Nova Zelândia e sobre o desenvolvimento *in utero* e pós-natal da prole. Coelhos F0 receberam 4 doses intramusculares de Abrysvo[®] (2 vezes a dose recomendada para humanos, 2 vezes antes do acasalamento e 2 vezes durante a gestação). Não houve indicação de toxicidade sistêmica materna nem efeitos relacionados ao desempenho no acasalamento ou fertilidade em coelhas fêmeas, ou na sobrevivência embrionária ou pós-natal, crescimento ou desenvolvimento na prole F1.

4. CONTRAINDICAÇÕES



Abrysvo® é contraindicada nos casos de hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer componente da vacina (consultar COMPOSIÇÃO).

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Síndrome de Guillain-Barré

Os profissionais de saúde devem estar alertas aos sinais e sintomas da síndrome de Guillain-Barré para garantir o diagnóstico correto, a fim de iniciar cuidados de suporte e tratamento adequados e descartar outras causas.

Hipersensibilidade e anafilaxia

O tratamento médico e a supervisão sempre devem estar prontamente disponíveis no caso de um evento anafilático raro após a administração da vacina. É recomendada a observação do indivíduo vacinado por pelo menos 15 minutos após a vacinação.

Trombocitopenia e transtornos de coagulação

Abrysvo® deve ser administrada com cautela em indivíduos com trombocitopenia ou qualquer transtorno de coagulação, pois pode ocorrer sangramento após a administração intramuscular nesses indivíduos.

Doença concomitante

A vacinação com Abrysvo® deve ser adiada em indivíduos com doença febril aguda. No entanto, a presença de uma infecção menor, como um resfriado, não deve resultar no adiamento da vacinação.

Reações relacionadas à ansiedade

Reações relacionadas à ansiedade, incluindo reações vasovagais (síncope), hiperventilação ou reações relacionadas ao estresse podem ocorrer em associação com vacinação como uma resposta psicogênica à agulha da injeção. É importante que os procedimentos estejam em vigor para evitar lesões decorrentes de desmaios.

Indivíduos imunocomprometidos

Indivíduos imunocomprometidos, incluindo aqueles que recebem terapia imunossupressora, podem apresentar diminuição da resposta imune à Abrysvo®. Os dados disponíveis estão incluídos nos itens 9. Reações Adversas e 2. Resultados de Eficácia.

A resposta imunológica à vacina pode ser alterada se o paciente estiver sob tratamento imunossupressor.

Indivíduos com menos de 24 semanas de gestação

Abrysvo® não foi estudada em mulheres gestantes com menos de 24 semanas de gestação. Dado que a proteção do bebê contra o VSR depende da transferência de anticorpos maternos através da placenta, Abrysvo® deve ser administrada entre as 24 e as 36 semanas de gestação (vide item 8. Posologia e Modo de Usar).

Limitações da efetividade da vacina

Como com qualquer vacina, a vacinação com Abrysvo® pode não proteger todos os vacinados.

Rastreabilidade

De modo a melhorar a rastreabilidade dos medicamentos biológicos, o nome e o número do lote do medicamento administrado devem ser registrados de forma clara.

Fertilidade, gravidez e lactação

Fertilidade

Não há dados em humanos sobre o efeito de Abrysvo® na fertilidade.

Estudos em animais não indicaram efeitos nocivos diretos ou indiretos relacionados à fertilidade das fêmeas (vide item 3. Características Farmacológicas - Dados de segurança pré-clínicos).



Gravidez

Uma grande quantidade de dados sobre mulheres gestantes (mais de 4.000 desfechos expostos) não indica malformações nem toxicidade fetal/neonatal.

Risco Potencial de Nascimento Prematuro

Um desequilíbrio numérico em nascimentos prematuros em receptores de Abrysvo® foi observado em comparação com receptores de placebo em dois estudos clínicos (vide item 9. Reações Adversas). Os dados disponíveis são insuficientes para estabelecer ou excluir uma relação causal entre nascimento prematuro e Abrysvo®. As gestantes com risco aumentado de parto prematuro foram geralmente excluídas dos estudos clínicos de Abrysvo®.

Abrysvo® é um medicamento classificado na categoria A de risco de gravidez. Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.

Lactação

Não se sabe se Abrysvo® é excretada no leite humano. Nenhum efeito adverso de Abrysvo® foi demonstrado em recém-nascidos amamentados por mães vacinadas.

Uso criterioso no aleitamento ou na doação de leite humano.

O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.

Efeitos na Habilidade de Dirigir e Operar Máquinas

Abrysvo® não influencia (ou tem influência desprezível) na capacidade de dirigir e operar máquinas.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Abrysvo® pode ser administrada concomitantemente com a vacina influenza sazonal (QIV, antígeno de superfície, inativado, com adjuvante). Num estudo aleatorizado em adultos com 65 anos de idade ou mais, foram cumpridos os critérios de não inferioridade das respostas imunológicas no grupo de administração concomitante versus o grupo de administração separada. No entanto, foram observados títulos de neutralização do VSR A e B numericamente mais baixos e títulos de inibição da hemaglutinação da gripe A e B numericamente mais baixos quando Abrysvo® e a vacina influenza sazonal com adjuvante inativado foram coadministrados do que quando foram administrados separadamente. A relevância clínica deste achado é desconhecida.

Abrysvo® pode ser administrada concomitantemente com a vacina de mRNA COVID-19, com ou sem vacina de alta dose contra influenza administrada concomitantemente, com base nos dados de um estudo em adultos com 65 anos de idade ou mais. A não inferioridade imunológica foi demonstrada para a administração concomitante de Abrysvo® e vacina de mRNA COVID-19 em comparação com a administração individual. Os títulos neutralizantes (NT) de VSR A e VSR B e ambas as cepas SARS-CoV-2 Ômicron BA.4/BA.5 e cepa de referência atenderam ao critério de não inferioridade predefinido. A não inferioridade imunológica também foi demonstrada para a administração concomitante de Abrysvo®, vacina de mRNA COVID-19 e vacina de alta dose contra influenza em comparação com a administração individual. Nessa análise, todos os antígenos, incluindo NTs de VSR A e VSR B, ambas as cepas SARS-COV-2 Ômicron BA.4/BA.5 e cepa de referência, e cada um dos quatro títulos de inibição de hemaglutinação (HAI) específicos de cepa atenderam ao critério de não inferioridade predefinido.

Abrysvo® pode ser administrada concomitantemente com a vacina contra a gripe sazonal (dose padrão com adjuvante ou dose alta sem adjuvante), com base nos dados de um estudo em adultos com 65 anos de idade ou mais, no qual Abrysvo® foi administrada concomitantemente com uma vacina quadrivalente contra a gripe adjuvante inativada (QIV) e o estudo acima com Abrysvo®, Cominarty® e vacina contra a gripe de alta dose.

É recomendado um intervalo mínimo de duas semanas entre a administração de Abrysvo® e a administração de uma vacina contra tétano, difteria e coqueluche acelular (**dTpa**). Não houve preocupações de segurança quando Abrysvo® foi coadministrada com **dTpa** em mulheres saudáveis não gestantes. As respostas imunológicas ao VSR A, VSR B, difteria e tétano na administração concomitante não foram inferiores às respostas imunológicas a esses antígenos após administração separada. No entanto, as respostas imunológicas aos componentes da



coqueluche foram inferiores na administração concomitante em comparação com a administração separada e não cumpriram os critérios de não inferioridade. A relevância clínica deste achado é desconhecida.

Incompatibilidade

Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento não deve ser misturado com outros medicamentos.

Se Abrysvo® for administrada ao mesmo tempo que outra vacina injetável, as vacinas sempre devem ser administradas em locais de injeção diferentes.

7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Abrysvo® deve ser armazenada em geladeira (de 2 °C a 8 °C) e pode ser utilizada por 4 anos a partir da data de fabricação.

Não congelar. Descartar se o produto for congelado. Manter na embalagem original.

Após reconstituição:

Abrysvo® deve ser administrada imediatamente após o preparo. Caso não seja possível, o produto reconstituído pode ser armazenado sob refrigeração (de 2 °C a 8 °C) ou em temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C) por até 4 horas. O produto reconstituído não utilizado em até 4 horas deve ser descartado. Não congelar.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Características físicas e organolépticas: O pó ou massa é branco. O diluente é um líquido límpido e incolor.

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

Posologia

Imunização de gestantes

Abrysvo® é administrada em dose única (0,5 mL) no segundo ou terceiro trimestre da gestação (24-36 semanas).

Indivíduos com 18 anos de idade ou mais

Abrysvo® é administrada em dose única (0,5 mL).

População pediátrica

A segurança e a eficácia de Abrysvo® em crianças (desde recém-nascidos a pessoas com menos de 18 anos de idade) por imunização ativa ainda não foram estabelecidas. Os dados disponíveis sobre adolescentes gestantes e seus lactentes são limitados.

Método de administração

Abrysvo® é apenas para injeção intramuscular, preferencialmente na região do deltoide do braço.

Abrysvo® não deve ser administrada por via intravascular, intradérmica ou subcutânea.

Não misture Abrysvo® com outras vacinas/medicamentos na mesma seringa.

Para obter instruções sobre reconstituição e manuseio do medicamento antes da administração, vide subitem “Precauções especiais para descarte e manuseio”.



Precauções especiais para descarte e manuseio

Para uso do frasco da vacina VSR, seringa preenchida de diluente e adaptador de frasco-ampola


A vacina liofilizada (pó) deve ser reconstituída apenas com o diluente fornecido e utilizando o adaptador de frasco-ampola.

Preparação para administração

Frasco-ampola		Adaptador de
contendo vacina VSR	Seringa contendo diluente	frasco-
liofilizada		ampola




Tampa da seringa Adaptador Luer Lock




Passo 1. Anexe o adaptador do frasco-ampola

- Retire a tampa superior da embalagem do adaptador do frasco-ampola e retire a tampa removível do frasco.
- Mantendo o adaptador do frasco-ampola para injetáveis na embalagem, centralize-o sobre a rolha do frasco e conecte-o com um empurrão firme direto para baixo. Não empurre o adaptador do frasco-ampola em ângulo, pois isso pode resultar em vazamento. Remova a embalagem.



Passo 2. Reconstituir o componente da vacina liofilizada para formar Abrysvo®

- Para todas as etapas de montagem da seringa, segure a seringa apenas pelo adaptador Luer lock. Isto evitará que o adaptador Luer lock se solte durante a utilização.
- Gire para remover a tampa da seringa e depois gire para conectar a seringa ao adaptador do frasco. Pare de girar quando sentir resistência.
- Injete todo o conteúdo da seringa no frasco-ampola. Mantenha a haste do êmbolo pressionada e gire suavemente o frasco-ampola em movimentos circulares até que o pó esteja completamente dissolvido (menos de 1 minuto). Não agite.



Passo 3. Retirar a vacina reconstituída

- Inverta completamente o frasco-ampola e retire lentamente todo o conteúdo para a seringa para garantir uma dose de 0,5 mL de Abrysvo®.
- Gire para desconectar a seringa do adaptador do frasco-ampola.
- Coloque uma agulha estéril adequada para injeção intramuscular.

A vacina preparada é uma solução límpida e incolor. Inspeção visualmente a vacina quanto a partículas grandes e descoloração antes da administração. Não use se forem encontradas partículas grandes ou descoloração.

Para uso do frasco-ampola da vacina VSRpreF e do frasco-ampola do diluente

A vacina liofilizada (pó) deve ser reconstituída somente com o frasco-ampola de diluente fornecido para formar Abrysvo®.

Recomenda-se a utilização de agulhas estéreis para aplicação intramuscular com comprimento variável de acordo com a idade, peso corporal e massa muscular do indivíduo. A seleção do calibre e do comprimento adequados deve ser realizada pelo profissional de saúde responsável pela aplicação, considerando as características anatômicas e clínicas do indivíduo de forma a garantir a correta disposição da vacina no tecido muscular.

Preparação para administração



1. Utilizando uma agulha estéril e uma seringa estéril, retire todo o conteúdo do frasco-ampola que contém o diluente.
2. Injete todo o conteúdo da seringa no frasco-ampola que contém o pó. Gire suavemente o frasco em movimentos circulares até que o pó esteja completamente dissolvido. Não agite. Retire 0,5 mL do frasco-ampola contendo a vacina reconstituída.
3. A vacina preparada é uma solução límpida e incolor. Inspeção visualmente a vacina quanto a partículas grandes e descoloração antes da administração. Não use se forem encontradas partículas grandes ou descoloração.

Descarte

Os medicamentos não utilizados ou os resíduos devem ser descartados de acordo com as exigências locais.

9. REAÇÕES ADVERSAS

Resumo do perfil de segurança

As reações adversas mais frequentemente relatadas foram fadiga (33%), dor no local da vacinação (27%), cefaleia (24%), mialgia (21%) e artralgia (10%). A maioria das reações locais e sistêmicas solicitadas foram de intensidade leve a moderada e se resolveram em 1 a 3 dias após o início.

Tabela 10. Eventos adversos de interesse especial relatados, do nascimento aos 24 meses de idade - Participantes bebês - População de segurança

EAIE	Grupo de Vacina Materna (conforme administrada)			
	Abrysvo [®] (N ^a =3659)		Placebo (N ^a =3646)	
	n ^b (%)	(95% IC) ^c	n ^b (%)	(95% IC) ^c
SARS-CoV-2 teste positivo	119 (3,3)	(2,7, 3,9)	111 (3,0)	(2,5, 3,7)
Bebê com baixo peso ao nascer	186 (5,1)	(4,4, 5,8)	158 (4,3)	(3,7, 5,0)
Bebê prematuro	207 (5,7)	(4,9, 6,5)	172 (4,7)	(4,1, 5,5)
Atrasos no desenvolvimento ^d	25 (0,7)	(0,4, 1,0)	17 (0,5)	(0,3, 0,7)

Abreviatura: EAIE = evento adverso de interesse especial.

^a N = número de participantes do grupo vacinado. Este valor é o denominador para os cálculos percentuais.

^b n = número de participantes que relataram pelo menos 1 ocorrência do evento adverso específico.

^c Intervalo de confiança (IC) bilateral exato calculado usando o método Clopper e Pearson.

^d Atraso no desenvolvimento refere-se a um evento adverso de interesse especial relatado a qualquer momento após o nascimento durante o período do estudo.

Não foram identificadas reações adversas ao medicamento em participantes lactentes nascidos de mães vacinadas.

Lista tabulada de reações adversas ao medicamento

O perfil de segurança de Abrysvo[®] é baseado em uma análise conjunta de dados de estudos clínicos (n=24.339, incluindo eventos locais e sistêmicos relatados por 9.367 participantes) e da experiência pós-comercialização. Nos estudos clínicos, participaram 3.813 gestantes com ≤49 anos de idade e 20.526 indivíduos com 18 anos de idade ou mais.

As reações adversas estão listadas abaixo por classe de sistema de órgãos e por frequência.

Muito comum (≥1/10); Comum (≥1/100 a <1/10); Incomum (≥1/1.000 a <1/100); Rara (≥1/10.000 a <1/1.000); Muito rara (<1/10.000).

Tabela 11. Reações Adversas ao Medicamento (RAMs) por Classe de Sistema de Órgãos e Categoria de Frequência do Conselho de Organizações Internacionais de Ciências Médicas (CIOMS) listadas em ordem decrescente de gravidade médica ou importância clínica dentro de cada categoria de frequência e Classe de Sistema de Órgãos (SOC)

Classe de sistema de órgãos	Termo da RAM	Frequência ^a
Doenças do sangue e do sistema linfático		
	Linfadenopatia	Rara
Distúrbios do sistema imunológico		



	Reações de hipersensibilidade ^b	Rara
	Anafilaxia ^c	Muito rara
Distúrbios do sistema nervoso		
	Cefaleia	Muito comum
	Síndrome de Guillain-Barré	Muito rara
Distúrbios musculoesqueléticos e dos tecidos conjuntivos		
	Mialgia	Muito comum
	Artralgia	Muito comum
Distúrbios gerais e condições do local de administração		
	Fadiga	Muito comum
	Dor no local da vacinação	Muito comum
	Vermelhidão no local da vacinação	Comum
	Inchaço no local da vacinação	Comum

^a Estudos agrupados WI257521, C3671001, C3671003, C3671004, C3671008, C3671013, C3671014, C3671023 SSA, C3671053.

^b Reações de hipersensibilidade incluem erupção cutânea e urticária.

^c Estudo C4841001.

Populações especiais

Indivíduos imunocomprometidos com 18 anos de idade ou mais

Todas as reações locais observadas provocadas foram de gravidade leve a moderada e a maioria teve duração média de 1 a 3 dias. O relato de reações locais tendeu a ser menor após a dose 1 do que após a dose 2. Dor no local da injeção foi a reação local mais frequentemente relatada. As reações sistêmicas observadas foram, em sua maioria, de gravidade leve a moderada e a maioria teve duração média de 1 a 4 dias, com relato de qualquer reação sistêmica semelhante após cada dose. A reação sistêmica mais frequentemente relatada foi fadiga. Reações sistêmicas graves foram relatadas em 2% e 6% dos participantes de 18 a <60 anos e ≥60 anos de idade, respectivamente, após qualquer dose.

Indivíduos com infecção pelo HIV

Gestantes com infecção por HIV e seus bebês

O perfil de segurança do Abrysvo[®] em gestantes com infecção estável por HIV e seus bebês, incluindo desfechos de gravidez e nascimento, foi semelhante ao observado na população agrupada.

Indivíduos com 60 anos de idade ou mais com infecção por HIV

O perfil de segurança do Abrysvo[®] em indivíduos com 60 anos de idade ou mais com infecção estável por HIV foi semelhante ao observado na população agrupada.

Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, notifique os eventos adversos pelo Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa.

10. SUPERDOSE

Não foram reportados casos de superdosagem durante os estudos clínicos com a vacina.

A superdosagem com Abrysvo[®] é improvável devido à sua apresentação de dose única.

Não existe um tratamento específico para a superdosagem de Abrysvo[®]. Em caso de superdosagem, o indivíduo deve ser monitorado e receber tratamento sintomático, conforme apropriado.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.



III - DIZERES LEGAIS

Registro: 1.2110.0498

Produzido por:
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Puurs-Sint-Amands – Bélgica

Importado por:
Pfizer Brasil Ltda.
Rodovia Presidente Castelo Branco, nº 32501, km 32,5
CEP 06696-000 – Itapevi – SP

Registrado por:
Pfizer Brasil Ltda.
Rua Alexandre Dumas, 1860
CEP 04717-904 – São Paulo – SP
CNPJ nº 61.072.393/0001-33

VENDA SOB PRESCRIÇÃO

USO RESTRITO A ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

CDS18_v1a

Fale | **0800-7701575**
Pfizer | www.pfizer.com.br



HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DE BULA

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº. do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº. do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
24/06/2026		10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	28/10/2025	1430031251	11958 - PRODUTOS BIOLÓGICOS - 70. Alteração do prazo de validade do produto terminado - Moderada	15/06/2026	CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO	VPS	60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS + SOL DIL SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML +ADAP + 1 AGU 60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT 10 FA VD TRANS + 10 SOL DIL FA VD TRANS X 0,5 ML
27/05/2026	0521943264	10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	27/05/2026	0521943264	10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	27/05/2026	- RESULTADOS DE EFICÁCIA - REAÇÕES ADVERSAS - QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?	VP/VPS	60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS + SOL DIL SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML +ADAP + 1 AGU 60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT 10 FA VD TRANS + 10 SOL DIL FA VD TRANS X 0,5 ML
06/03/2026	0218674261	10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	06/03/2026	0218674261	10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	06/03/2026	- IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO - RESULTADOS DE EFICÁCIA - ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES - REAÇÕES ADVERSAS - ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? - QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?	VP/VPS	60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS + SOL DIL SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML +ADAP + 1 AGU 60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT 10 FA VD TRANS + 10 SOL DIL FA VD TRANS X 0,5 ML
24/09/2025	1278869255	10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	29/01/2025	0134447/25-1	11971 PRODUTOS BIOLÓGICOS - 78. COADMINISTRAÇÃO COM MEDICAMENTO BIOLÓGICO OU SINTÉTICO	01/09/2025	- O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? - COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? - RESULTADOS DE EFICÁCIA - ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES - INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS - POSOLOGIA E MODO DE USAR	VP/VPS	60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS + SOL DIL SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML +ADAP + 1 AGU 60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT 10 FA VD TRANS + 10 SOL DIL FA VD TRANS X 0,5 ML

15/07/2025	0917904/25-7	10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	13/12/2023	1426082/23-4	11922 PRODUTOS BIOLÓGICOS - 36. ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO OU COMPOSIÇÃO DO PRODUTO TERMINADO - MAIOR	02/06/2025	• APRESENTAÇÃO • O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? • QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? • RESULTADOS DE EFICÁCIA • ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES • INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS • POSOLOGIA E MODO DE USAR • REAÇÕES ADVERSAS	VP/VPS	60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS + SOL DIL SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML +ADAP + 1 AGU 60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT 10 FA VD TRANS + 10 SOL DIL FA VD TRANS X 0,5 ML
24/03/2025	0396951/25-2	10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	11/03/2025	...	10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12		• QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? • RESULTADOS DE EFICÁCIA • REAÇÕES ADVERSAS	VP/VPS	60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS + SOL DIL SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML +ADAP + 1 AGU
05/02/2025	163171/25-4	10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	22/08/2024	1162495/24-7	11969 - PRODUTOS BIOLÓGICOS - 77c. Ampliação de uso	20/01/2025	• PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? • O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? • QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? • INDICAÇÕES • RESULTADOS DE EFICÁCIA • ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES • CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO • POSOLOGIA E MODO DE USAR • REAÇÕES ADVERSAS	VP/VPS	60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS + SOL DIL SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML +ADAP + 1 AGU
			05/06/2024	757290/24-5	11958 - PRODUTOS BIOLÓGICOS - 70. Alteração do prazo de validade do produto terminado - Moderada	20/01/2025			
09/01/2025	045550/25-5	10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	09/01/2025	--	10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12		• QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? • REAÇÕES ADVERSAS	VP/VPS	60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS + SOL DIL SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML +ADAP + 1 AGU
25/11/2024	1610372/24-7	10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário	25/11/2024	1610372/24-7	10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário		• O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? • RESULTADOS DE EFICÁCIA • ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES	VP/VPS	60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS + SOL DIL SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML +ADAP + 1 AGU

		RDC 60/12			RDC 60/12		• REAÇÕES ADVERSAS		
12/09/2024	1254326/24-3	10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	12/09/2024	1254326/24-3	10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12		• REAÇÕES ADVERSAS	VPS	60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS + SOL DIL SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML +ADAP + 1 AGU
16/05/2024	0654938245	10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	16/05/2024	0654938245	10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12		- IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO - PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? - INDICAÇÕES - RESULTADOS DE EFICÁCIA - POSOLOGIA E MODO DE USAR - REAÇÕES ADVERSAS - DIZERES LEGAIS	VP/VPS	60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS + SOL DIL SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML +ADAP + 1 AGU
17/04/2024	0485732246	10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	17/04/2024	0485732246	10456 - PRODUTO BIOLÓGICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12		• IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO	VP/VPS	60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS + SOL DIL SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML +ADAP + 1 AGU 60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT 5 FA VD TRANS + 5 SOL DIL SER PREENC VD TRANS X 0,5ML + ADAP + 5 AGU 60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT 10 FA VD TRANS + 10 SOL DIL SER PREENC VD TRANS X0,5 ML + ADAP + 10 AGU
05/04/2024	0434192244	10463 - PRODUTO BIOLÓGICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	28/08/2023	0913790234	1528 PRODUTO BIOLÓGICO - REGISTRO DE PRODUTO NOVO	01/04/2024	• VERSÃO INICIAL	VP/VPS	60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS + SOL DIL SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML +ADAP + 1 AGU 60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT 5 FA VD TRANS + 5 SOL DIL SER PREENC VD TRANS X 0,5ML + ADAP + 5



									AGU 60 MCG + 60 MCG PO LIOF INJ CT 10 FA VD TRANS + 10 SOL DIL SER PREENC VD TRANS X0,5 ML + ADAP + 10 AGU
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---